

Aus dem Zentrum für Klinische Chemie,  
Immunologie und Humangenetik

UNTERSUCHUNG HL-A SPEZIFISCHER  
ZYTOTOXINE IN SEREN SCHWANGERER  
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG  
VON KREUZREAKTIONEN.

Inaugural-Dissertation  
zur  
Erlangung des Doktorgrades  
des Bereiches Humanmedizin  
der  
Justus Liebig-Universität Gießen

vorgelegt von  
Vera Rothenberg  
aus Frankfurt/Main

Gießen 1974



Aus dem Zentrum für Klinische Chemie,  
Immunologie und Humangenetik

**UNTERSUCHUNG HL-A SPEZIFISCHER  
ZYTOTOXINE IN SEREN SCHWANGERER  
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG  
VON KREUZREAKTIONEN.**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des Doktorgrades

des Bereiches Humanmedizin

der

Justus Liebig-Universität Gießen

vorgelegt von

Vera Rothenberg

aus Frankfurt/Main

Gießen 1974



- Dekan: Prof. Dr. Ringleb
1. Berichterstatter: Prof. Dr. Mueller-Eckhardt
  2. Berichterstatter: Prof. Dr. Wellensiek

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| A. ZWECK DER UNTERSUCHUNG                                         | 1     |
| B. LITERATURÜBERSICHT                                             | 2     |
| I. Definition des HL-A-Systems.<br>Transplantationsantigene ..... | 2     |
| II. Zur Entdeckungsgeschichte .....                               | 2     |
| III. Methoden der Leukozytengruppierung .....                     | 4     |
| IV. Genetik .....                                                 | 5     |
| V. Serologie .....                                                | 6     |
| VI. Bedeutung des HL-A-Systems .....                              | 8     |
| 1. Transplantationen .....                                        | 8     |
| 2. Transfusionen .....                                            | 9     |
| 3. Schwangerschaft .....                                          | 10    |
| 4. Krankheitsdisponierung .....                                   | 12    |
| 5. Paternitätsserologie .....                                     | 12    |
| 6. Anthropologie .....                                            | 13    |
| VII. Biologische Bedeutung .....                                  | 13    |
| C. METHODIK                                                       |       |
| I. Überblick über den Arbeitsgang .....                           | 16    |
| II. Lymphozytotoxizitäts-Test .....                               | 17    |
| 1. Prinzip .....                                                  | 17    |
| 2. Ausführung .....                                               | 17    |
| a) Material .....                                                 | 17    |
| b) Vorbereitung .....                                             | 18    |
| c) Zellgewinnung .....                                            | 18    |
| d) Zytotoxische Reaktion .....                                    | 18    |
| e) Färbung .....                                                  | 18    |
| f) Fixierung .....                                                | 18    |
| g) Ablesung .....                                                 | 18    |
| h) Bewertung .....                                                | 19    |
| III. Absorption und Elution .....                                 | 19    |
| 1. Prinzip der Absorption .....                                   | 19    |
| 2. Prinzip der Säureelution .....                                 | 19    |



|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Ausführung .....                                                               | 20  |
| IV. Statistische Auswertung der Serographen .....                                 | 20  |
| D. ERGEBNISSE .....                                                               | 21  |
| I. Überblick .....                                                                | 21  |
| II. 1. Kreuzreaktionen .....                                                      | 21  |
| 1a. Quantifizierung der Kreuzreaktionen .....                                     | 30  |
| 2. Beziehung zwischen Antigen-Milieu<br>und Spezifität des Antikörpers .....      | 31  |
| 3. RNEP-Phänomen .....                                                            | 34  |
| 4. Antikörper-Verbreiterung in den<br>Eluaten .....                               | 36  |
| 5. Antikörperspezifität vor und nach der<br>Entbindung .....                      | 36  |
| 6. Monospezifische Seren .....                                                    | 37  |
| 7. Beziehung zwischen Antikörperfrequenz<br>und Schwangerschaften und Geburten .. | 38  |
| 8. Transfusions-, Fehl- und Frühge-<br>burtenanamnese .....                       | 38  |
| 9. Zum Problem der Verwandtschaft<br>zwischen HL-A 9 und HL-A 2 .....             | 40  |
| III. 1. Erläuterungen zu einzelnen Seren .....                                    | 41  |
| a) oligospezifische Seren .....                                                   | 41  |
| b) monospezifische Seren .....                                                    | 48  |
| 2. Serographen .....                                                              | 50  |
| E. DISKUSSION .....                                                               |     |
| I. Diskussion der Ergebnisse .....                                                | 108 |
| 1. Kreuzreaktionen .....                                                          | 108 |
| 2. Monospezifische Seren .....                                                    | 110 |
| 3. RNEP-Phänomen .....                                                            | 111 |
| II. Diskussion der Methode .....                                                  | 111 |
| 1. Wahl der Methode .....                                                         | 111 |
| 2. Fehlerquellen .....                                                            | 112 |
| 3. Kritik der statistischen Auswertung ...                                        | 113 |

|                         | Seite |
|-------------------------|-------|
| F. ZUSAMMENFASSUNG      | 115   |
| G. LITERATURVERZEICHNIS | 116   |

## A. ZWECK DER UNTERSUCHUNG

Die Entdeckungsgeschichte des HL-A-Systems hat ihre Impulse von Anfang an weniger aus den natürlich auftretenden Auswirkungen des Systems erhalten, wie z.B. den neonatalen Thrombozytopenien und Purpura, als vielmehr aus Beobachtungen von Reaktionen des menschlichen Organismus auf Bluttransfusionen, Haut- und Nierentransplantationen.

Bei diesen Organverpflanzungen scheinen Kreuzreaktionsbeziehungen zwischen HL-A-Antigenen einen gewissen Einfluß auf die mittlere Überlebenszeit des Transplantats zu haben (1,2). Klinisch wird dies wichtig bei Hautverpflanzungen (2) und Bluttransfusionen (120), besonders bei vorimmunisierten Empfängern (122) (SIN phenomenon, 121). Ob Kreuzreaktionen die Auswahl von Empfängern/Spendern bei Nierentransplantationen in Zukunft wesentlich beeinflussen müssen, ist heute noch zu früh zu entscheiden. Jedenfalls wird der Einfluß voraussichtlich geringer sein als bei der Haut, weil an der Niere die HL-A-Antigene weniger dicht angeordnet sind.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen im Ansatz dazu beitragen, aus der differenzierten Kenntnis der Kreuzreaktionen eine sinnvolle Auswahl bei Hauttransplantationen und Bluttransfusionen zu ermöglichen und die Voraussetzung dafür sein, späterhin das Problem der Überlebenszeiten von Transplantaten unter dem Gesichtspunkt von Kreuzreaktionen zu diskutieren. Dabei muß im Auge behalten werden, daß hierbei vorausgesetzt wird eine Korrelation zwischen humoraler Immunantwort, wie sie anhand von Antikörpern untersucht wird und zellulärer Immunantwort, von der die Transplantatabstoßung im wesentlichen abhängt.

## B. LITERATURÜBERSICHT

### I. DEFINITION DES HL-A-SYSTEMS

#### Transplantationsantigene

Bestimmte Leukozytenmerkmale haben den Charakter von Transplantations-, Gewebe- oder HL-A-Antigenen (HL-A = Human Lymphocyte-/Leucocyte Antigen (123)). Sie sind sowohl auf Leukozyten, Thrombozyten und Retikulozyten (5) nachweisbar, als auch im Gewebe (3, 4) und gelten heute als die wichtigsten serologisch definierten Transplantationsantigene neben den ABO-Blutgruppen (6, 124). Das schwache 5a/5b-System soll bei der Organtransplantation bedeutungslos sein (125). Insofern ist die Deutung von HL-A im Sinne von Histocompatibilitäts-Locus-Antigen praktisch berechtigt (126). Ein eigenes Histocompatibilitäts-System stellen die MLC-Loci dar (MLC = Mixed Lymphocyte Culture), von deren Produkten aber noch fraglich ist, ob sie Antigene darstellen, gegen die Antikörper gebildet werden.

### II. ZUR ENTDECKUNGSGESCHICHTE

1899 berichtete METCHNIKOFF, daß bei Mäusen Leukozyten-Transfusionen zur Produktion von Antikörpern führten (7, zit. nach 49). 27 Jahre später erklärte DOAN, Leukozytenantikörper seien natürlich vorkommende Isoantikörper (8, zit. nach 49). Sie konnten aber nur bei Leukopenien und Agranulozytosen demonstriert werden (9, 10, 11).

Den ersten sicheren Beweis dafür, daß Leukozyten Transplantationsantigene tragen, erbrachte MEDAWAR 1946, als er nicht nur bestätigen konnte, daß die Transplantatabstoßung ein Immunphänomen ist, sondern auch zeigte, daß diese immunologische Reaktionslage, die Sensitivität gegen Transplantate, durch eine intradermale Leukozyten-Injektion hervorgerufen werden konnte (12). Diese Feststellungen wurden in der darauffolgenden Zeit oftmals bestätigt (13, 14). Zunächst aber, in der Zeit zwischen 1950 und 1960, konzentrierte sich das allgemeine Interesse noch auf die Bedeutung von Leukozyten-Antikörpern für die Autoimmunmechanismen bei Leukopathien (4)<sup>†</sup>. Man hielt Leukoagglutinine für Autoimmunantikörper, die Agranulozytosen verursachen (47, 10, 95, 96).

Mit der Zeit ergaben sich immer mehr Hinweise auf den Isoimmuncharakter der Leukozytenagglutinine: 1953 wurden Agglutinine gegen Plättchen in polytransfundierten Patienten und in Müttern gefunden, deren Kinder neonatale Purpura gehabt hatten (90, 91). DAUSSET wies 1954 erstmals auf einen möglichen

---

<sup>†</sup>) Die im folgenden Text gemachte Einteilung der Entdeckungsgeschichte in drei Phasen lehnt sich an einen Vorschlag WALFORDS an (4).

Zusammenhang zwischen Leukozytenantikörpern und Bluttransfusionen hin (94), den VAN LOGHEM und PAYNE 1957 statistisch belegen konnten (10, 92, 93). Auch BRITTINGHAM und CHAPLIN sprachen sich für eine kausale Beziehung zwischen Transfusionen und Leukozytenantikörpern aus (15). Während dieser ersten Jahre der Entdeckungsgeschichte des HL-A-Systems spielten Schwangerenser eine unbedeutende Rolle. Zwar diskutierte man die möglichen Serenquellen, maß aber den Schwangerenser keine große Bedeutung zu (98, 99, 100). Erst PAYNE und ROLFS fanden 1958 bei ca. 10 % der untersuchten schwangeren Frauen Leukozyten-Agglutinine (51), was von VAN ROOD bestätigt wurde. Danach entdeckten HOWELL, JENSEN, PAYNE und ROLFS und SALMON unabhängig voneinander, daß Frauen häufiger febrile Transfusionszwischenfälle haben als Männer, und brachten diesen Befund in Zusammenhang mit Leukozyten-Schwangeren-Antikörpern (47, 63, 101). JENSEN beschrieb 1962 als erster die Eignung der Schwangerenser als Leukoagglutininquelle (38), PAYNE (103) und VAN ROOD (12a) folgten mit Angaben über eine Frequenz von 20 % und 6 % positiver Seren. Etwas später nannten TERASAKI, COHEN, FINN und WOODROW 20 - 50 % für Zyto-toxine (zit. nach 102). Trotz allem wurden bis ungefähr 1965 alle Leukozytengruppierungen mit polytransfundierte Seren gemacht.

Auf die Jahre zwischen 1950 und 1960 folgte eine Phase, die gekennzeichnet war durch die rasch aufeinanderfolgende Benennung neuer Spezifitäten. Das Jahr 1962, in dem das erste definierte Antiserum (Anti-Mac, heute Anti-HL-A 2) käuflich zu erwerben war, könnte man als ihren Anfang betrachten. Die Vertiefung des Wissens über die einzelnen HL-A-Antigene wurde durch verschiedene Faktoren ermöglicht:

1. Die bis dahin üblichen Leukozyten-Agglutinations-Methoden, vor allem aber der Antiglobulin-Konsumptionstest und die Gerinnsel-Retraktionsmethode wurden durch den sensibleren Lymphozytotoxizitätstest und die besser reproduzierbare Komplementbindungsreaktion abgelöst.
2. Bei der Ermittlung von Seren mit signifikant ähnlichen Reaktionsmustern wurden Computer eingesetzt: VAN ROOD (104) fand 1963 die Antigene 4a, 4b, die nach unserem heutigen Wissen zum großen Teil der zweiten Serie zuzuordnen sind (105). PAYNE und BODMER et al. entdeckten 1964 auf diese Art HL-A 1 und HL-A 2 (106, 107).
3. Mit der Zeit brachten Familienstudien (17, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 97) den Beweis, daß die Mehrzahl der HL-A-Antigene zu einem einzigen genetischen System gehört, was die Definition neuer Spezifitäten erleichterte.

Die sich rasch erweiternden Kenntnisse über die einzelnen HL-A-Spezifitäten ermöglichten bald ihre Anwendung auf die Probleme der Transplantation. Eine intensive Beschäftigung mit dem Gebiet der Gewebsverträglichkeit wurde damit in Angriff genommen. Die letzten sechziger und der Anfang der siebziger Jahre lenkten den Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Anthropologie und auf die Beziehungen zwischen HL-A-Genotyp und Krankheitsrisiken.

### III. METHODEN DER LEUKOZYTENGRUPPIERUNG

Es existiert eine Vielfalt von Methoden zur Leukozytengruppierung. Nur wenige genügen allerdings den von der WHO aufgestellten Kriterien (WHO-Memorandum 1969):

1. gute Reproduzierbarkeit,
2. Schnelligkeit (für Leichentypisierungen),
3. Mikromethode.

Als geeignet erwiesen sich die Komplementbindungsreaktion, der Lymphozytotoxizitätstest und die Leukozytenagglutination, (Tab. 1).

| Methoden                                                                | Reproduzierbarkeit                                                       | Empfindlichkeit                                                                | besondere Schwierigkeiten                            | Zeitaufwand | Zelllagerung |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Komplement-Fixation<br>- mit Plättchen<br>- mit Lymphozyten             | besser als beim LZTT                                                     | geringer als beim LZTT mit Plättchen besser als mit Lymphozyten                | mit Plättchen erst 24 Std. nach Blutentnahme möglich | 1,5 Std.    | +            |
| Lymphozytotoxizitätstest (LZTT)                                         | 95 - 99 % abhängig von Seren                                             | besser als bei der Kompl.-Fixation; schlechter als bei Leukozytenagglutination |                                                      | 3 Std.      | -            |
| Leukozytenagglutination<br>- mit EDTA-Blut<br>- mit defibriniertem Blut | schlecht; 95 % bei positiven Ergebnissen, 66 % bei negativen Ergebnissen | besser als beim LZTT; mit defibriniertem Blut empfindlicher als mit EDTA-Blut  | Granulozyten erforderlich                            |             | -            |

Noch bis 1960 waren die Leukozyten- und Plättchenagglutination, der Antiglobulin-Konsumptionstest und die Gerinnelsretraktionsmethode üblich; erst dadurch, daß sie durch die Mikrokomplementbindungsreaktion und den Lymphozytotoxizitätstest ersetzt wurden, wurde eine weitergehende Spezifizierung im HL-A-System möglich.

Es steht heute fest, daß zumindest für bestimmte Antigene die Sensitivität der einzelnen Tests unterschiedlich ist. Daraus folgt, daß man nicht ohne weiteres Genfrequenzen, Immunisierungsprozentzahlen, Typisierungsergebnisse, die mit verschiedenen Methoden erstellt wurden, vergleichen kann.

#### IV. GENETIK

Der HL-A-Typ des Menschen wird durch jeweils zwei Spezifitäten der ersten und zweiten Serie definiert, insgesamt also durch vier Merkmale, die jeweils zur Hälfte einen mütterlichen und väterlichen Erbanteil ausdrücken. Mütterliche und väterliche HL-A-Antigene prägen sich kodominant aus. Rekombinationsuntersuchungen machen es wahrscheinlich, daß das HL-A-Genmaterial eines haploiden Chromosomensatzes auf einem einzigen noch unbekannten Chromosom nahe beisammen liegt. Die angegebenen Rekombinationsraten streuen zwischen 0 % (4) und 2 % (18).

Bis heute sind zwei wichtige Probleme strittig geblieben: erstens welche genetische Struktur der Antigeneinteilung zuzuordnen ist, die aufgrund der serologischen Daten erarbeitet wurde, und zweitens welcher Natur die Genprodukte sind.

Zu Punkt eins wäre prinzipiell denkbar:

- a) Die Antigene der LA- und VIER-Serie werden von zwei nahe beieinanderliegenden Genorten gesteuert, auf denen jeweils ein Allel zur Ausprägung kommt. Das würde bedeuten, daß die Gene jeweils zwei Polypeptidketten produzieren.
- b) Die Antigene der LA- und VIER-Serie werden von zwei mutierten Stücken eines einzigen Gens gesteuert. Berücksichtigt man die oben genannte Rekombinationsrate, so würde das bedeuten, daß das Gen die Bildung einer Makropolypeptidkette steuert, deren Anfangs- und Endstück unmittelbar oder mittelbar zur Ausprägung der HL-A-Merkmale führen. Das Mittelstück müßte dann schwach oder überhaupt nicht immunogen sein (was nicht unvereinbar sein muß mit der biologischen Funktion des HL-A-Systems) oder dürfte mittelbar nicht zur Ausprägung eines HL-A-Merkmals führen. Die Rekombinationsrate spricht prinzipiell nicht gegen die Ein-Gen-Hypothese, da auch intragenetische Rekombinationen vorkommen. Allerdings liegt die Rekombinationsrate in solchen Fällen niedriger.

Die experimentellen Funde reichen zur Zeit noch nicht hin, dieses Problem zu entscheiden. Die Gelfiltrationschromatographie nach MANN et al. (19), in der die Antigene des ersten und zweiten Locus in zwei Gipfeln getrennt dargestellt werden konnten, hat wegen der dabei vorausgehenden Papainbehandlung einen zweifelhaften Aussagewert. Mehr Wahrscheinlichkeit kann nach neueren Untersuchungen von BERNOCO et al. (169) und NEAUPORT et al. (170) die Ein-Gen-Hypothese für sich in Anspruch nehmen. Sie fanden, daß trotz Aggregation eines HL-A-Antigens die anderen Antigene in ihrer normalen Position bleiben ("Capping"). BERNOCO et al. halten es thermodynamisch gesehen für unwahrscheinlich, daß dabei kovalente, hydrophobe oder Disulfidbrücken gelöst werden könnten.

Zu Punkt zwei: "Welcher Natur sind die Genprodukte?" weiß man:

Aus den Untersuchungen der letzten Zeit (171, 172) geht hervor, daß es sich wahrscheinlich um Polypeptidketten bzw. Glykoproteine handelt (Größe ca. 300 - 500 Aminosäuren). Der Kohlenhydratanteil wird unterschiedlich hoch beziffert: KAHAN und REISFELD (20) 0 %, MANN et al (21) 5 - 7 %. Die Funktion der Kohlenhydrate ist noch ungeklärt. Sie sollen für die Antigenspezifität bedeutungslos sein. Es wäre denkbar, daß der Zuckeranteil eine gemeinsame Grundsubstanz, wie sie von MIYAKAWA (173) und VAN ROOD, LEEUWEN, ZWEERNS (174) vermutet wurde, analog der H-Substanz im ABO-System (175), darstellt.

Die biochemischen Befunde machen zwei Modelle möglich: die HL-A-Gene kontrollieren direkt die Strukturproteine der HL-A-Antigene, welche sekundär irgendwelche Kohlenhydratmoleküle binden. Oder die HL-A-Gene kontrollieren Reaktionsproteine, Enzyme, die spezifische Kohlenhydrate an Peptidketten anbinden.

Eine Besonderheit des HL-A-Systems soll noch erwähnt werden. Bestimmte Gene sind öfter miteinander auf einem Chromosom assoziiert, als es ihrer Genfrequenz nach zu erwarten wäre. Es liegt daher im HL-A-System ein Kopplungsungleichgewicht vor, wie es auch vom Rh- und MNSs-System bekannt ist.

## V. SEROLOGIE

Mit Hilfe von serologischen Bevölkerungsstudien und Familienuntersuchungen kann man eine Einteilung des HL-A-Systems in serologisch kleinste Einheiten vornehmen. Die Antigene faßt man in zwei Gruppen, die 1. und 2. Serie oder auch LA- und VIER-Serie, zusammen. In Tabelle II sind die Spezifitäten einzeln aufgeführt. Das Präfix HL-A bezeichnet solche Antigene, die von der WHO benannt wurden, "W" diejenigen, mit denen auf der 4. und 5. "International Histocompatibility Workshop Conference" 1970 in Los Angeles und 1972 in Evian gearbeitet wurde und die international anerkannt wurden.

Die Verteilung der Antigene auf getrennte, nicht kreuzreagierende Gruppen wird allgemein als Interpretationsmodell genutzt; allerdings haben BATCHELOR und SELWOOD auf folgendes hingewiesen (114): bei einem Versuch, die Spezifität von Antigenen zu bestimmen, wurden mit einem Computer vier verschiedene multi-alleleische Antigen-Einteilungssysteme erarbeitet, die verschiedenen serologischen Anforderungen genügen, z.B. war ein Null-Antigen im voraus mit einkalkuliert. Es muß aber hinzugefügt werden, daß nur die herkömmliche Einteilung ungefähr in Einklang zu bringen ist mit den Ergebnissen, die durch Familienstudien gewonnen worden sind.

Die Frage, ob weitere Antigen-Serien existieren, ist offen. Bisher sind mit ganz wenigen Ausnahmen alle Antigene, die einer dritten Serie angehören sollten, später als Teile der ersten oder zweiten Serie identifiziert worden (z.B. Lc-17, Lc-20, vgl. 6). Es gibt aber interessante Hinweise, die die Annahme einer dritten Serie zu stützen scheinen (127). Die Frage wird wohl erst nach einiger Zeit abschließend beantwortet werden können.

| LA-Locus                                         | 4-Locus                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| HL-A 1                                           | HL-A 5 $\begin{cases} A5-AJ \\ A5^+ \end{cases}$                 |
| HL-A 2                                           | HL-A 7                                                           |
| HL-A 3                                           | HL-A 8                                                           |
| HL-A 9                                           | HL-A 12 $\begin{cases} A12-vP \\ A12-R^+ \\ A12^+ \end{cases}$   |
| HL-A 10 $\begin{cases} To31 \\ To40 \end{cases}$ | HL-A 13                                                          |
| HL-A 11                                          | W5 ( $R^+$ ) $\begin{cases} W5-Wo \\ W5^+ \end{cases}$           |
| W28 ( $Ba^+$ )                                   | W10 (BB) $\begin{cases} W10-FJH^+ \\ W10^+ \end{cases}$          |
| W19.1 (Ge33)                                     | W14 (MaKi)                                                       |
| W19.3 (To43)                                     | W15 (LND) $\begin{cases} W15-AJ \\ W15-R^+ \\ W15^+ \end{cases}$ |
| W19.4 (To42)                                     | W17 (MaPi)                                                       |
| W19.5 (To30)                                     | W18 (JD)                                                         |
| W19.6 ( $Li^e$ )                                 | W22 (AA) $\begin{cases} W22-AJ \\ W22-AA^+ \end{cases}$          |
| $X_{LA}$                                         | W27 (FJH) $\begin{cases} W27-AJ \\ W27-FJH^+ \end{cases}$        |
|                                                  | ET                                                               |
|                                                  | ET $^+$                                                          |
|                                                  | $X_4$                                                            |

TABELLE II

## VI. BEDEUTUNG DES HL-A-SYSTEMS

### 1. Transplantationen

Die Organverträglichkeit zwischen HL-A-identischen Geschwistern (Verträglichkeitsgrad  $A_1$ ) wird übereinstimmend als sehr gut beschrieben (1). Hinsichtlich der schlechter verträglichen  $A_2$  bis F-Kombinationen kommen die Untersucher dagegen zu verschiedenen Ergebnissen.

So berichtete TERASAKI 1968 und 1969 (70,71) über signifikante Unterschiede zwischen A- und B-Kombinationen (HL-A-Identität und Kompatibilität) einerseits und C- und D-Kombinationen (HL-A Inkompatibilität von ein und zwei Antigenen) andererseits. Ähnlich günstig sind die Ergebnisse von SCANDIA-TRANSPLANT (152), die eine 100 %-ige Überlebenschance des Transplantats bei  $A_3$ -Matches und eine 71 %-ige bei D-Matches zeigen. Auch OLIVER, SACHS und FESTENSTEIN (153) schätzen die Rolle der HL-A-Typisierung für bedeutsam ein. Ihnen zufolge sind die Überlebenschancen des Transplantats signifikant besser, wenn Spender und Empfänger für drei oder mehr Antigene kompatibel sind.

Anders muß man die Bedeutung der HL-A-Typisierung nach ROOD und EERNISSE (12a) beurteilen. Sie berichteten, daß bei Nierentransplantationen zwischen HL-A-kompatiblen und inkompatiblen Empfänger-/Spender-Paaren, wenn überhaupt, nur ein ganz geringer Unterschied in der mittleren Überlebenszeit besteht. Auch TERASAKI stellte 1971 (154) die Wichtigkeit von HL-A-Typisierungen infrage, als er berichtete, daß keine signifikante Abhängigkeit des Transplantationsergebnisses vom HL-A-Verträglichkeitsgrad zu erheben war.

Eine große Schwierigkeit beim Vergleich von Gewebetypisierungen und klinischen Resultaten machte von jeher die signifikante Anzahl von HL-A-inkompatiblen Nierentransplantaten, die gut funktionierten (151). Inzwischen sind in den MLC-Loci Genorte gefunden worden, die die Gewebeverträglichkeit wesentlich mitbestimmen können und dafür verantwortlich sind, daß sich HL-A-identische Personen in der gemischten Lymphozytenkultur stimulieren. Die MLC-Typisierung vor Nierentransplantationen wird in Zukunft abhängen von der Erstellung einer genügend schnellen Methode.

Neben der MLC-Inkompatibilität mögen noch andere Sachverhalte die Divergenz der obigen Berichte mitverursachen:

1. wurden die Merkmale mit Hilfe von monospezifischen Seren definiert, die, wie sich später zeigte, einen komplexen Aufbau besaßen.
2. Lassen sich die Ergebnisse von Hauttransplantationen wegen der unterschiedlichen Antigendichte schlecht auf die Verhältnisse bei der Niere übertragen.

3. Lassen die Befunde von LENGEROVA und VIKLICKY an Mäusen es sehr wahrscheinlich erscheinen, daß es eine Reihenfolge der Antigene nach ihrer Antigenstärke gibt. Es wurden aber bei Organtransplantationen die beobachteten mittleren Überlebenszeiten bisher nicht nach der Stärke der jeweils inkompatiblen Antigene korrigiert. Daher sind die ermittelten mittleren Überlebenszeiten auch in diesem Sinn nur Mittelwerte, die von der Größe des Untersuchungsmaterials abhängen.
4. Wurden die Ähnlichkeiten zwischen den inkompatiblen Antigenen (Kreuzreaktionen) vernachlässigt, obwohl für Haut- (155) und Nierentransplantate (151a) gesichert ist, daß eine oder zwei Kreuzreaktionen eine mittlere Lebenszeit erzielen, die in der Mitte zwischen identischen und inkompatiblen Kombinationen liegt. Es ist allerdings anzunehmen, daß die mittlere Überlebenszeit der Niere weniger von den Kreuzreaktionen zwischen inkompatiblen Antigenen beeinflusst wird als die Haut, weil ihre Zellen weniger Antigen tragen als Epidermiszellen (4).

## 2. Transfusionen

Infolge der unterschiedlichen Auswahlkriterien, Untersuchungstechniken und Auswertungsmodi sind die in der Literatur genannten Antikörperfrequenzen nach Transfusionen schlecht zu vergleichen. Die Gruppe von Oh (34) gibt bei fünf und weniger Transfusionen eine Frequenz von 50 % und bei mehr als 20 Transfusionen 89 % der Patienten mit antileukozytären Antikörpern an.

Die HL-A-Antikörper sind ab einer gewissen Stärke deshalb so gefährlich, weil sie bei einer erneuten Vollbluttransfusion zu febrilen und urticariellen Reaktionen führen können (15, 40, 46, 101). In einem Fall wurde als Todesursache, autopsisch gesichert eine Abfiltration von Leukozytenagglutinaten in den Alveolenkapillaren (149, 150). Wegen dieser Gefahr ist man allgemein dazu übergegangen, Patienten nach dem ersten Transfusionszwischenfall nur noch gewaschene Erythrozyten zu verabreichen.

Die Korrelation zwischen Transfusionszwischenfällen und antileukozytären Antikörpern ist statistisch abgesichert (42, 43, 39, 30, 46, 47, 48).

Die früher mit großem Blutverbrauch durchgeführten Hämodialysen hatten zur Folge, daß trotz der relativen Immunsuppression der Urämiker nach 18 Monaten bei 59,6 % der Fälle Antikörper gefunden wurden (34). Die Verkleinerung des Blutverbrauchs hat in der letzten Zeit die Frequenz aber erniedrigt.

### 3. Schwangerschaft

Im Verlauf der Schwangerschaft kommt es bei einem Teil der Frauen zu einer Immunisierung gegen die vom Vater vererbten HL-A-Antigene des Kindes (49, 50, 51, 12a, 53, 54). Als Immunisierungsweg werden u.a. diskutiert:

1. Sich ablösende Trophoblastzellen, Größenordnung  $10^5$ /die. Dieser Vorgang ist allein beim Menschen und bei Chincillas beschrieben worden (52, 55, zit. nach 44).
2. Der von SCHRÖDER und DE LA CHAPELLE beschriebene aktive Lymphozytentransport durch die Placenta (45).
3. Lösliche Antigene (33).

Um Vor- und Nachteile dieser Immunisierung zu beleuchten, ist es nützlich, zunächst die klinischen Folgen darzustellen.

a) Der Zusammenhang der antileukozytären Antikörper mit Leukopenien ist noch unklar. Inkomplette Antikörper scheinen zwar die Durchschnittszahlen der kindlichen Leukozyten zu senken, sie bleiben aber klinisch unwirksam (56). Trotzdem werden gelegentlich Leukopenien im Zusammenhang mit hochtitrigen Leukozyten-Iso-Antikörpern beschrieben (59). Neutropenien werden wahrscheinlich selten oder nie von HL-A-Antikörpern verursacht (4). Nach LALEZARI et al. ist dafür ein granulozytenspezifischer Antikörper Voraussetzung (60). Dagegen haben HL-A-Antikörper größeren Anteil an neonatalen Thrombozytopenien und neonataler Purpura (82). Wahrscheinlich ist das Folge von zwei Sachverhalten:

1. Bei jeder HL-A-Antigen-/Antikörper-Komplexbildung scheinen Plättchen unspezifisch einbezogen und verbraucht zu werden (1).
2. Der Kompensationsmechanismus scheint für Leukozyten besser zu sein als für Thrombozyten, der Reservepool größer (58). Man schließt das aus der Beobachtung, daß die gleichzeitige Übertragung von Plättchen- und Leukozyten-Antikörper der gleichen Spezifität nur zu Thrombopenien geführt haben (58).

b) Nach JENSEN (38) findet man Frühgeburten öfter bei Trägerinnen von Leukozyten-Antikörpern als bei Frauen ohne Antikörper. JENSEN beziffert den Anteil der Frühgeburten bei Antikörper-Trägerinnen mit 17 % aller Geburten, bei Frauen ohne Leukozyten-Antikörper mit 7 %. Bei seiner Untersuchung stieg die Frühgeburtenfrequenz mit wachsender Schwangerschaftszahl, während sie in der Kontrollgruppe ohne Antikörper fiel.

Als Ursache für den Zusammenhang zwischen Leukozyten-Iso-Antikörpern und Frühgeburten diskutiert man eine Direktwirkung der Antikörper auf die Placenta und eine Störung, die die Immunantwort des Organismus verstärkt und gleichzeitig die Frühgeburt verursacht.

- c) Zum Thema Mißbildungen findet man in der Literatur Widersprüchliches. Zum Großteil sprechen die Berichte gegen einen Zusammenhang zwischen Mißbildungen und Antikörpern (137, 102). Selbst wenn ein statistischer Zusammenhang als erwiesen gelten würde, so gälte das nicht für den ursächlichen Zusammenhang. Die Gruppe von NAITO, MICKEY et al. (62) und TERASAKI (138) haben als einzige die Bedeutung des Antikörper-Titers im ersten Trimenon als kritischen Faktor erwähnt.
- d) Auch die Darstellung des Zusammenhangs mit Fehl- und Totgeburten ist in der Literatur kontrovers. Während KESSLER (139) und JENSEN (38) eine deutliche Tendenz für einen bestehenden Zusammenhang angeben, lehnen andere den Zusammenhang ab (137, 102).
- e) Von großem klinischen Interesse ist die Tendenz zu Doppelimmunisierungen gegen das Rhesus- und HL-A-System (137, 141, 140). Sie erklärt sich zum Teil daraus, daß im Rahmen eines Morbus haemolyticus neonatorum eine gesteigerte Neubildung von Retikulozyten einen zusätzlichen Stimulus zur Leukozyten-Isoantikörper-Synthese darstellt. Ausgehend von den Befunden von MOULINIER (142) und der Arbeitsgruppe um NAITO (62), nach denen das Zusammenwirken beider Antikörper die Überlebenschancen bei neonataler Hämolyse erniedrigt, wurde vorgeschlagen, Schwangeren prophylaktisch Anti-D und Anti-HL-A-Seren zu geben (143). Andere Autoren lehnen jedoch einen Einfluß auf den klinischen Verlauf des M. haemolyticus neonatorum ab (144, 137, 141). Auch für die Mutter kann die humorale Immunisierung von Bedeutung werden.
- f) DAUSSET (10a) berichtete 1970 in einer vorläufigen Studie von einer Feiung der Frauen gegen akute myeloblastische Leukämie nach der dritten Schwangerschaft (61, zit. nach 27).
- g) Bestimmte ungeklärte Formen weiblicher Sterilität, besonders sekundäre Formen (145), werden mit Leukozyten-Isoantikörpern in Zusammenhang gebracht (64). STOLP zufolge fanden sich bei 12 von 48 sterilen und infertilen Frauen antileukozytäre und antithrombozytäre Antikörper. Der Angriffspunkt in der Fertilisierung ist noch ungeklärt.
- h) Insbesondere bei Multiparae ist in den ersten Jahren nach der Entbindung die Möglichkeit nichthämolytischer Transfusionsreaktionen gegeben (126). Man sollte sie durch Verabreichung von gewaschenem Erythrozytenkonzentrat anstelle von Vollblut vermeiden (126).
- i) Ferner verursachen die Anti-HL-A-Antikörper eine signifikante Häufung der hyperakuten Nierenabstoßung bei Müttern, während die kinderlosen Frauen die gleiche Abstoßungsquote haben wie Männer (146).

Die Bedeutung der klinischen Auswirkungen der HL-A-Antikörper muß vor dem Hintergrund der langen Antikörperspersistenz gesehen werden: nach einem Jahr post partum sollen diese Antikörper noch zu 80 % vorhanden sein (103).

Die negative Bilanz der klinischen Auswirkungen der humoralen Immunisierung gibt Anlaß zu der Frage, welches das Ziel des aktiven Lymphozytentransports durch die Placenta und die Trophoblastenzellablösung tatsächlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die aktive Lymphozytenpassage, die schon in der 12. Schwangerschaftswoche einsetzt, also zu einem Zeitpunkt, wo die fötalen HL-A-Antigene zwar schon da, aber noch nicht ausgereift sind, auf eine partielle Immunparalyse der Mutter abzielt. Die Immunparalyse ist erforderlich, damit sie zusammen mit anderen Hilfsfaktoren (physikalische Barriere (147)), erhöhter ACTH- und Cortison-Spiegel (147) und Plasmafaktoren (148), die Abstoßung des Fötus-Allotransplantats verhindert. In diesem Fall wäre die humorale Immunisierung der Mutter nur ein unerwünschter Sonderfall, der nur deshalb nicht zum Normalfall wird, weil die Absorptionskapazität des Feten für HL-A-Antikörper groß ist.

#### 4. Krankheitsdisponierung

Im Kapitel "Biologische Bedeutung" wurde auf den Zusammenhang zwischen HL-A- Genotypen und bestimmten hingewiesen. Es liegen solche Berichte u.a. über chronische Glomerulonephritis (74), MS (157), Psoriasis (158), Morbus Hodgkin (159, 160), akute lymphatische Leukämie (160), akute und chronische myeloische Leukämie (166), Retinoblastom, Multiples Myelom (166), Paralytische Poliomyelitis (156), Chorionepitheliom (161), Myasthenia gravis (162), akute vordere Uveitis (163), Reiter'sche Krankheit (164) und Dermatitis herpetiformis vor (165).

Es wurde schon an die Möglichkeit gedacht, Spermatozoen mit zytotoxischen Seren auszusortieren, um ein Krankheitsrisiko zu mindern (73, zit. nach 1). Allerdings gibt es dazu keine genügend zellschonende Technik. Hierbei taucht die Frage auf, ob genetische Dispositionen überhaupt weiter erforscht werden sollen, solange keine prophylaktischen Maßnahmen zur Verfügung stehen.

#### 5. Paternitätsserologie

Durch seinen extremen Polymorphismus eignet sich das HL-A-System ausgezeichnet für Vaterschaftsbestimmungen. Die allgemeine Vaterschaftsausschlußchance unter Verwendung der Systeme ABO, MNSs, P, K, Rh, Fy, Jk, Lu, Xg, Se, Hp, Gm, Inv, Gc, SEP, PGM<sub>1</sub>, ADA und AK erhöht sich dadurch von 94 % auf 98,5 % (124).

## 6. Anthropologie

Auch für die anthropologische Forschung ist das HL-A-System besonders geeignet durch seinen Polymorphismus. Die Merkmale weisen in den einzelnen Ländern und Rassen verschiedenen Frequenzen auf. Mit Hilfe von Cluster-Analysen ist es gelungen, ein hypothetisches Modell der Entwicklung der einzelnen Rassen zu konstruieren. Eine Übersicht ist dem 5. Workshop 1972 in Evian zu entnehmen.

## VII. DIE BIOLOGISCHE BEDEUTUNG DES HL-A-SYSTEMS

Die Besonderheit des technischen Zugangs zum HL-A-System hat dazu geführt, daß zunächst ausschließlich die Bedeutung des Systems für die Transplantationsimmunologie bearbeitet wurde und nicht für die Bereiche, in denen seine Hauptmerkmale, nämlich seine interindividuelle Differenzierung, seine intraindividuelle Stabilität und Komplexität, sich möglicherweise als selektiver Evolutionsvorteile auswirken konnten.

Bevor die Frage nach der Bedeutung der Merkmale der HL-A-Antigene für den Selektionsvorteil in der Phylogenese erörtert werden soll, mögen zwei Voraussetzungen zu dieser Frage genannt werden:

- a) daß die Existenz des HL-A-Systems nicht als Zufall betrachtet wird, was durch die damit verbundene Verschwendung von Genom selbst einem Selektionsnachteil gleichkäme;
- b) daß man einen Unglücksfall im Sinne einer Inkorporation viraler Genome, deren Folgen sich durch identische Reproduktion stabilisiert haben, nicht ohne Beweise als befriedigende Erklärung annehmen will.

Im Folgenden sollen einige Überlegungen zur biologischen Bedeutung von zwei Kennzeichen des HL-A-Systems dargestellt werden, nämlich

1. von der Variationsbreite zwischen den Arten und Individuen, und
  2. von der Komplexität des Systems.
- Wann und wo wirken sich diese Eigenschaften als biologischer Schutz aus?

Zur interindividuellen Variabilität:

Es gibt eine ganze Reihe von Angaben, die einen statistischen Zusammenhang zwischen Krankheiten, besonders Autoimmunerkrankheiten, Virus- und Tumorerkrankungen und Histokompatibilitäts-Genfrequenzen belegen (vgl. den Abschnitt "Krankheitsdisponierung"). Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Einmal könnten die Histokompatibilitätsgene des Menschen gekoppelt sein mit den Genen, die die Immunantwort steuern (128) bzw. als Sonderfall könnten sie die Hormonantwort der

Lymphozyten indirekt beeinflussen über die Steuerung des Hormonmetabolismus, wie dies bei der Maus der Fall zu sein scheint (129). Oder aber, die menschlichen Histokompatibilitäts-Antigene besitzen bestimmte Strukturen gemeinsam mit den Antigenen von Tumoren, Bakterien und Viren (130, 131), was als sehr wahrscheinlich angesehen wird. Die oben erwähnten Zusammenhänge zwischen Krankheit und HL-A-Typ werden verständlich, wenn man bedenkt, daß ein Antigen niemals immunogen per se ist. Um als fremd von dem Organismus erkannt zu werden, muß es sich über ein Mindestmaß hinaus von ihm unterscheiden. Das bedeutet z.B. für ein Virus, daß es um so virulenter ist, je ähnlicher sein Antigenmuster (bzw. das Muster, das es sich auf seiner Außenhaut zugelegt hat (Mimikry)) mit dem des Wirtes ist. Bei einem Tumor heißt das, daß die Abwehrlage des Körpers um so schlechter ist, je ähnlicher die Tumorantigene den körpereigenen HL-A-Antigenen sind. Zum Beispiel treten bei Eskimomüttern maligne Chorionepitheliome zehnmal häufiger auf als bei europäischen Müttern (132), weil bei den Eskimos ein Teil der bekannten HL-A-Spezifitäten äußerst selten ist und Mutter und Kind deshalb öfter HL-A-identisch sind. Anders sieht JERNE die Bedeutung der Variabilität. Er begreift die interindividuelle Differenzierung der Antigene als Grundlage für die individuellen Spezifitätsspektren der Antikörper (30). Ausgehend von der Burnet'schen Clonal-Selections-Theorie (1959), nach der eine ausdifferenzierte immunkompetente Zelle nur noch eine einzige Antikörpersorte bilden kann, spekuliert er, daß zunächst nur solche Zellen zur Antikörperproduktion und Proliferation stimuliert werden, die Antikörper gegen körpereigene Antigene produzieren können. Im Verlauf dieser Proliferation werden Mutationen auftreten, die sich weiter reproduzieren, während die nicht mutierten Zellen, die noch Antikörper gegen körpereigene Antigene bilden, zugrunde gehen (Ausbildung der Selbsttoleranz).

Er stützt sich dabei auf Tierversuche, aus denen hervorgeht, daß die Immunantwort gegen bestimmte Antigene mit bestimmten Histokompatibilitätsantigenmustern verbunden ist (31, zit. nach 1). Unbefriedigend an diesem Entwurf scheint mir, daß, indem nicht irgendwelche Vorteile für Individuen und Arten aufgezeigt werden können, die Notwendigkeit dieser Entwicklung nicht demonstriert wird.

#### Zur Komplexität:

Die Variabilität der Histokompatibilitätsantigene zwischen Arten und Individuen sieht HAUGHTON (32) nur als Nebenerscheinung der Komplexität an, d.h. er schreibt der Variabilität selbst keinen biologischen Vorteil zu. Er begreift das System als ein Detektormechanismus für somatische Mutationen,

während es selbst Folge von Mutationen ist, weil Viren, die sich durch Mutationen einem resistenten Wirt anzupassen suchen, selbst einen selektiven Druck auf das Histokompatibilitätssystem ausüben (133). Er setzt dabei voraus, daß sich Gen-Mutationen durch die Antigenveränderungen dem Abwehrsystem des Organismus zu erkennen geben. Das bedeutet im einzelnen:

1. daß die Mehrzahl der Antigene auf der Zelloberfläche lokalisiert sind (bei der Maus 80 % der H2-Antigene (134); beim Menschen ist eine Prozentzahl aus der Literatur nicht zu ersehen).
2. Daß die Histokompatibilitätsgene über möglichst viele Chromosomen verteilt sind. Das trifft bei der Maus zu, beim Menschen ist er nach dem heutigen Wissensstand nicht sicher auszuschließen.
3. Daß bei allen Tierarten und beim Menschen die allogene-tische Inhibition als Abwehrmechanismus gegen Verlust-mutanten funktioniert.
4. Daß die die Histokompatibilität bestimmenden Strukturen stabil sind. Tatsächlich bleiben die HL-A-Antigene konstant unter Kulturbedingungen (135), während andere Antigene verloren gehen (136).

Sofern diese Bedingungen erfüllt sind, scheint ein Versuch sinnvoll, das Histokompatibilitätssystem als ein Detektor-mechanismus von somatischen Mutationen zu begreifen, dessen Versagen den Körper z.B. dem Wachstum maligner Zellen schutzlos ausliefert.

Über die biologische Bedeutung während der Schwangerschaft siehe Abschnitt "Schwangerschaft".

## C. METHODIK

### 1. Überblick über den Arbeitsgang

1. Es wurden 400 Seren von 396 unausgewählten schwangeren Patientinnen der Frauenkliniken Gießen, Wetzlar und Lich auf zytotoxische antilymphozytäre Antikörper untersucht. Das Blut wurde kurz vor der Entbindung abgenommen und innerhalb von zwei Wochen untersucht. Als Untersuchungsmethode diente der Lymphozytotoxizitäts-Test nach NIH (199). Getestet wurde gegen Lymphozyten von anfangs 10, später 30 Testspendern. Als positiv wurden Seren mit Reaktionen von mindestens ++ (26 - 50 % abgetötete Zellen) angesehen. Waren die Spenderinnen positiv reagierender Seren zu erreichen, wurden innerhalb von ca. vier Wochen 200 ml Blut abgenommen und in kleinen Portionen bei  $-20^{\circ}\text{C}$ , versetzt mit einem 1/100 Volumen einer 1 %-igen  $\text{NaH}_3$ -Lösung, bis zum Untersuchungstag eingefroren.
2. Sobald wie möglich wurden die Seren gegen die Lymphozyten von 10 (30) Spendern angesetzt. Die "leeren" Plätze im Antigenmuster dieser Zellen sollten der Entdeckung neuer Antigene dienlich sein. Die Zellen waren vor Beginn der Arbeit mit dem Lymphozytotoxizitäts-Test durch Antiseren getestet worden, die zum kleinen Teil von MAYR, KISS-MEYER-NIELSEN zur Verfügung gestellt worden waren, z.T. mit gekauften Seren, vor allem aber durch eigene Seren, deren Spezifität durch Vergleich mit den fremden Seren bestimmt worden war. Auf den Lymphozyten waren folgende Antigene bestimmt: HL-A 1, 2, 3, 9, 10, 11, W19, W28; HL-A 8, W14, 5, 7, 12, 13, W15, W27, W22, W5, W10, W17, SL.
3. Gleichzeitig mit Schritt 2 wurden die Schwangerenserum gegen die Zellen der Ehemänner angesetzt, um zu prüfen, ob die Ehefrau eventuell gegen andere Antigene als die des Ehemannes Antikörper gebildet hatte. Außerdem wurden die Patientinnen und deren Ehemänner so weit wie möglich typisiert. Dies waren 41 Fälle bei den Männern und 40 bei den Frauen. Damit war die Zahl der infrage kommenden Antikörperspezifitäten von vorne herein vermindert. Bei polyspezifischen Seren wurden, soweit möglich, die Seren gegen die Zellen der Spenderin angesetzt, um Auto-Antikörper auszuschließen.

Es wurden 268 Plättchenabsorbate und -eluate mit Plättchen von insgesamt 75 Spendern, deren HL-A-Phänotyp bekannt war, hergestellt. Die verwendete Technik stellt eine Modifikation der Säure-Elutions-Methode von SHULMAN et al 1964 (58) dar, modifiziert nach HEINRICH und MUELLER-ECKHARDT (119).

Im Lymphozytotoxizitäts-Test wurden die Eluate und Absorbate auf ihre Spezifität geprüft gegen die Lymphozyten von durchschnittlich 30 Spendern, deren HL-A-Phänotyp ganz oder teilweise bekannt war.

## II. Lymphozytotoxizitäts-Test

### 1. Prinzip des Lymphozytotoxizitäts-Tests

Inkubiert man komplement-fixierende antilymphozytäre Antikörper und Komplement zusammen mit zellständigen Antigenen, gegen die die Antikörper gerichtet sind, so kommt es durch das Zusammenwirken von Komplement und Antikörpern zu einer Permeabilitätsstörung der Zellwand, die zur Folge hat, daß die Zelle in Minutenschnelle schwillt und intrazelluläre Ionen, Proteine und Nukleinsäuren verliert. In diesem Zustand nimmt die Zelle Farbstoff auf (Eosin, Trypan), wodurch sie von anderen Zellen im Mikroskop unterscheidbar wird: lebende Lymphozyten sind klein und hell, während die toten deutlich größer und dunkel sind. Mit säurefreiem Formalin wird dann die Morphe toter und lebender Zellen fixiert, um das Ergebnis zu standardisieren. Damit die Ansätze nicht austrocknen, werden alle Reaktionen unter Paraffinöl durchgeführt.

Die Reaktionsstärke ist abhängig von Temperatur, Inkubationszeit, dem Verhältnis von Komplement und Serum und der Spezifität des Antikörpers zum Antigen. Das Reaktionsmuster eines Serums mit verschiedenen Lymphozyten läßt Rückschlüsse auf die Spezifität des Antikörpers zu.

### 2. Ausführung des Lymphozytotoxizitäts-Tests

(nach der NIH-Zwei-Stufen-Methode, modifiziert nach MAYR)

#### a) Material

Für die Zellgewinnung:

1. Gummi arabicum
2. Ficoll-Isopaque
3. Tris-gepufferte balanzierte Salzlösung (Tris-Bss), pH = 7,45

Für den LZTT:

1. Antiseren, inaktiviert bei 56° C, 30 min. mit 1/100 Vol. 1 %-igem Na-Azid versetzt, zentrifugiert bei 15.000 UpM, 5 min.
2. Lymphozyten in Tris-Puffer suspendiert, Dichte 2.000/ul
3. Tris-Puffer, pH = 7,45 zur Verdünnung
4. Kaninchen-Komplement, lyophilisiert
5. Öl Shell Ondina 33
6. Formaldehyd
7. Eosin, 5 %-ige wässrige Lösung.

b) Vorbereitung der Testplatten

Die Felder der Testplatten (Firma Møller-Coats, Oslo) wurden unter Öl mit je 0,5 µl Testserum beschickt. Für die negative Kontrolle wurden pro Zellspender 0,5 µl Tris-Puffer auf einer Platte vorbereitet.

c) Lymphozytengewinnung

1. Zu je 30 ml defibriniertem Blut wurde 1 ml Gummi arabicum gegeben und 30 min. bei 37°C im Wasserbad inkubiert.
2. Die Erythrozyten und Granulozyten des Überstandes wurden mit steriler Watte absorbiert. Dazu wurden sie 30 min. bei 37°C inkubiert.
3. Das lymphozytenhaltige Serum wurde über 1 ml Ficoll-Isopaque geschichtet und 20 min. bei 300 UpM zentrifugiert. Erythrozyten und Granulozyten setzten sich am Boden ab. Die Lymphozyten waren als weißlicher Kreis zwischen Serum und Ficoll-Isopaque zu sehen.
4. Die Zellen der Interphase wurden gesammelt und dreimal mit Tris-Puffer gewaschen (300 UpM, 5 min.).
5. Zuletzt wurden die Zellen in Tris-Puffer suspendiert und ihre Dichte adjustiert auf 2.000 /µl.

d) Zytotoxische Reaktion

Phase I:

Reaktion zwischen Lymphozyten und Antikörpern. Auf die Felder der vorbereiteten Platten wurden je 0,5 µl der Lymphozytensuspension getropft und 30 min. bei Raumtemperatur inkubiert.

Phase II:

Zellschädigung durch Komplementzusatz. Es wurden 2 µl Kaninchenkomplement hinzugefügt, gemischt und 60 min. bei Raumtemperatur inkubiert.

e) Färbung

1 µl Eosin, 15 minütige Inkubation bei Raumtemperatur.

f) Fixierung

mit 2 µl Formalin.

g) Ablesung

Die Reaktionen wurden unter einem Phasenkontrast-Mikroskop abgelesen (WILD).

## h) Bewertung

Nach Euro-Transplant-Vorschrift gilt:

|      |   |                                    |     |     |
|------|---|------------------------------------|-----|-----|
| -    | = | weniger als 10 % abgetötete Zellen |     |     |
| (+)  | = | 10-15 %                            | -"- | -"- |
| +    | = | 16-25 %                            | -"- | -"- |
| ++   | = | 26-50 %                            | -"- | -"- |
| +++  | = | 51-80 %                            | -"- | -"- |
| ++++ | = | 81-100%                            | -"- | -"- |

Die negative Kontrolle bewegt sich bei sorgfältiger Zellzubereitung unter der 5 %-Grenze.

## III. Absorption und Elution

### 1. Prinzip der Absorption

Inkubiert man antikörperhaltiges Serum mit zellständigem Antigen, so haften die Antikörper an den Antigenen. Zentrifugiert man das Gemisch, so bleiben in dem überstehenden Serum diejenigen Antikörper-Populationen zurück, die mit dem angebotenen Antigen nicht reagierten.

Man wählt als Zellen solche, die schon im Lymphozytotoxizitäts-Test positiv reagierten, aber auch andere, deren Antigene mit dem Immunogen des Antikörpers kreuzreagieren. Drittens wählt man solche, mit denen der Antikörper aller Wahrscheinlichkeit nicht reagieren wird, um unspezifische Reaktionen auszuschließen.

Im letzten zeitlichen Drittel der Arbeit wurden die Absorbate folgendermaßen standardisiert: Das Antiserum wurde zur Absorption in einer Verdünnungsstufe angeboten, die zwei geometrische Stufen über der Verdünnung lag, bei der das Originalserum noch mit +/++ reagierte.

### 2. Prinzip der Säureelution

Setzt man unlösliche HL-A-Antigenantikörper-Komplexe für kurze Zeit einem pH von 2,8 bis 3,0 aus, so dissoziieren sie in Antigen und Antikörper, ohne daß der Antikörper durch diese kurze Prozedur wesentlich an Aktivität verliert.

Nach Zentrifugation erhält man den Antikörper im Überstand. Durch dosierte Zugabe von physiologischer Kochsalzlösung kann man die Konzentration des Antikörpers im Eluat verändern. So kann man schwach reagierende Antikörper des Originals anreichern und im Lymphozytotoxizitäts-Test besser als vorher spezifizieren.

Die gleichzeitige Anwendung von Absorption und Elution erlaubt es:

1. die vermutete Spezifität eines monospezifischen Serums zu prüfen,
2. nicht kreuzreagierende Antikörper voneinander zu trennen,
3. kreuzreagierende Antikörper in ihrer Breite zu bestimmen.

### 3. Ausführung der Absorption und Elution

Material:

1. Plättchensuspensionen, Dichte  $500.000/\text{mm}^3$ , suspendiert in physiologischer Kochsalzlösung mit 0,1 %-igem Natrium-Azid,
2. inaktivierte Antiseren, mit Zusatz von 1/100 Volumen 1 %-igem Natrium-Azid,
3. 0,1 n HCL-Lösung,
4. 0,02 n Nach-Lösung,
5. gepufferte physiologische NaCl -Lösung: 0,15 M NaCl und 0,0013 M  $\text{Na}_2\text{PO}_4$ ; pH = 7,2 nach SØRENSEN.

0,5 ml Plättchensuspension (Dichte  $3,10^9/\text{mm}^3$ ) und 0,5 ml Antiserum wurden eine Stunde lang bei Zimmertemperatur inkubiert. Es folgte eine 15 minütige Zentrifugation bei 3.000 UpM. Das Plättchensediment wurde dreimal in gepufferter Kochsalzlösung gewaschen, schließlich in 300 ml ungepufferter physiologischer Kochsalzlösung resuspendiert und mit 0,1 n HCL auf einen pH von 6,9 bis 7,1 eingestellt. Die Volumenmenge wurde mit gepufferter physiologischer Kochsalzlösung auf 500  $\mu\text{l}$  ergänzt.

### IV. Statistische Auswertung der Serographen

Aufgrund des Reaktionsmusters eines Serums wurden eine oder mehrere Vermutungen über die Spezifität eines Serums formuliert und mit dem Vier-Felder-Test getestet (167). Der  $\chi^2$ -Wert dient zum Vergleich der Reaktionen eines neuen Serums mit denen eines standardisierten Antiserums. Ein  $\chi^2$ -Wert, der größer als der Tafelwert ist, weist darauf hin, daß zwei Seren einen Antikörper gemeinsam haben, schließt aber nicht aus, daß sie zwei verschiedene Antikörper gegen assoziierte Antigene enthalten.

p gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Übereinstimmung zwischen gefundenen und erwarteten Werten zufällig ist. Es wurden nur Werte mit einer Wahrscheinlichkeit unter 5 % verwertet ( $p = 0,05$ ).

r ist der Korrelationskoeffizient  $r = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$ , der  $\chi^2$  nach der Gesamtzahl der Testfälle korrigiert, (168). Eine Spezifität wurde dann als wahrscheinlich gegeben betrachtet, wenn der Korrelationskoeffizient zwischen 0,8 und 1 variierte.

Bei der Auswertung des Materials wurden alle Ansätze mit solchen Zellen ausgelassen, die zufällig ein Antigen trugen, gegen das eine zweite Antikörperpopulation des Antiserums reagierte. Kreuzreaktionen wurden dabei nicht berücksichtigt. Außerdem wurde das Panel von solchen Zellen bereinigt, bei denen weniger als vier Antigene bestimmt waren.

## D. ERGEBNISSE

### I. Überblick

Zytotoxine wurden in 57 Seren (14 %) gefunden. Von insgesamt 43 absorbierten und eluierten Seren konnten 39 in ihrer Spezifität abgeklärt werden. Es hatten fünf Seren Antikörper gegen Antigene des ersten Locus, 27 gegen Antigene des zweiten, neun Antiseren hatten Antikörper gegen Antigene beider Loci. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, daß der erste Locus weniger Allele als der zweite hat und dadurch Mutter und Kind häufiger ein teilweise HL-A-identisches Muster haben (Tab. III, IV, V).

### II. Kreuzreaktionen

1. Folgende Kreuzreaktionen traten zwischen Antigenen der ersten Serie auf (Tab. III, Fig. 2):  $2 \times W28$ ,  $3 \times 11$ , unter Berücksichtigung sicherer RNEP-Phänomene:  $1 \times 9 \times 10 \times 11$ ,  $9 \times 2$ ,  $2 \times W19$ . Die Kreuzreaktionen waren insgesamt seltener und weniger vielgestaltig als zwischen Antigenen des zweiten Locus. Am häufigsten war die Kombination  $2 \times W28$  (sechsmal). Insgesamt gab es sechs Kombinationen zwischen Spezifitäten des ersten Locus. Wie aus Figur 1 ersichtlich, gab es keine Kombination, in der ein Glied der Gruppe Anti-HL-A 5, W17, W5 einerseits und eins der Gruppe Anti-HL-A 7, 8, W14 andererseits gleichzeitig vertreten war.

Die Kreuzreaktionen des zweiten Locus fanden sich in insgesamt 41 verschiedenen Kombinationen gegen 13 Spezifitäten gerichtet (Tab. VI, VII, Fig. 1). Nach der Häufigkeit der Kombinationen stand Anti-HL-A 5, mit acht anderen Spezifitäten 14-mal kombiniert, an erster Stelle, gefolgt von Anti-HL-A 7, ebenfalls mit acht Spezifitäten 12-mal kombiniert. Die häufigsten Kreuzreaktionen innerhalb des zweiten Locus bestanden zwischen HL-A 5 und W17 (8-mal), 5 und W5 (7-mal), 5 und W15 (4-mal), 5 und 13 (4-mal), 5 und 12 (3-mal) einerseits und zwischen HL-A 7 und W10 (9-mal), 7 und W27 (8-mal), 7 und W15 (4-mal) andererseits. Die Kreuzreaktion  $8 \times W14$  fand sich zweimal. Ein Serum reagierte mit  $8 \times W14 \times 7$ . Alle bekannten Kreuzreaktionen wurden an diesem Material bestätigt, mit Ausnahme von  $1 \times 3$  und  $10 \times W19$ .

Es werden zusätzlich drei seltene Kreuzreaktionen beschrieben:  $1 \times (9)$  (Serum 1291),  $W27 \times 5$  (Serum 1012) und  $7 \times 8 \times W14$  (Serum 1008) (Bericht bei 181). Sie werden genauer beschrieben unter Abschnitt D. III. 1. a) (Erläuterungen zu einzelnen Seren).

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp<br>der Serumsponderin | HL-A-Phänotyp<br>des Ehemannes | Zahl der<br>Eluate | Antikörperspezifität             |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 977       | 1,3/5, W14                          | 2,-/W15, Gi1                   | 4                  | 2 + W28 <sup>+</sup>             |
| 919       | 9,10/-,-                            | W28,-/5,-                      | 5                  | 2 + W28 <sup>+</sup>             |
| 1196      | W32,-/5,-                           | 1,2/8, W10                     | 7                  | 2 + W28 + (W19) <sup>+</sup>     |
| 1214      | 1,10/8, W17                         | 2,-/7, W10                     | 2                  | 2 + W28 + (3?, 11?) <sup>+</sup> |
| 1225      | 1,3/7,-                             | 2,-/12, W17                    | 2                  | 2 + W28 <sup>+</sup>             |
| 1272      | 3,-/7, W5                           | 2,3/W5,-                       | 4                  | 2 + W28                          |
| 1176      | W32,-/5,-                           | 2,-/5, 12                      | 3                  | 2 <sup>+</sup>                   |
| 1256      | 3,9/W10,-                           | -, -/W5, 12                    | 4                  | 2 <sup>+</sup>                   |
| 1291      | W28,9/7, W17                        | 1,-/5, 8                       | 5                  | 1 (4 9 + 10 + 11)                |
| 1247      | 9,-/-,-                             | 3,-/7, 5                       | 2                  | 3 + 11 <sup>+</sup>              |
| 1282      | 3,-/7, W14                          | 2,-/(12), -                    | 3                  | 9 + (2) <sup>+</sup>             |
| 1079      | 1,2/7, 8                            | 1,2/W5,-                       | 6                  | 9 + (2)                          |
| 1240      | 3,-/5, 7                            | 3,9/7, W5                      | 5                  | 9                                |

Tabelle III: Kreuzreaktionen von 13 Antiseren und ihren Eluates (N = 52) gegen HL-A-Antigene der ersten Serie, RENAP-Phänomene mit eingeschlossen (in Klammern).  
Zeichenerklärung siehe Tabelle IV.

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp<br>des Serumsenders | HL-A-Phänotyp<br>des Ehemannes | Zahl der<br>Euate | Antikörperspezifität                          |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| S 919     | 9,10/-,-                          | W28,-/5,-                      | 5                 | 5 + W17 + (Gi3?, 12?) <sup>+</sup>            |
| S 955     | n.b.                              | n.b.                           | 6                 | 5 + W5 + W15 + W17                            |
| S 960     | n.b.                              | 2,-/W27, W17                   | 4                 | 5 + (W15)                                     |
| S 1012    | 1,-/7,8                           | -,-/W27, W10                   | 6                 | 5+W17+12+13+W27+W10+(W15)                     |
| S 1043    | 2,-/7,-                           | 2,-/5, W17                     | 7                 | 5+W5+W17+W15+Gi3+12+13                        |
| S 1054    | 2,10/W10,-                        | 3,-/5,7                        | 5                 | 5+W5+W17+13+(Gi3)                             |
| S 1065    | 9, W32/7, SL                      | 2,-/5,7                        | 4                 | 5 + W5 + Gi1                                  |
| S 1079    | 1,2/7,8                           | 1,2/W5,-                       | 6                 | 5+W17+Gi1+Gi3+(12?, W10?) <sup>+</sup>        |
| S 1106    | 1,-/8,-                           | 1,-/8, W15                     | 10                | 5+W5+W17+12+13+W10§                           |
| S 1126    | 2,-/W27,-                         | 3,10/7,(5,12, W17)             | 4                 | 5+W5+W15+12+13+(Gi3)                          |
| S 1220    | 2,3/12, W15                       | 2,10?/5,-                      | 6                 | 5 + (W5) <sup>+</sup>                         |
| S 1256    | 3,9/W10,-                         | -,-/W5,12                      | 4                 | 5 + (W5) <sup>+</sup>                         |
| S 1282    | 3,-/7, W14                        | 2,-/(12),-                     | 3                 | 5 + W5 + W17 + W15 <sup>+</sup>               |
| S 907     | 2,3/13, W5                        | W28,-/7,8                      | 8                 | 7 + W10 + W27 + (W15)                         |
| S 908     | 2,-/12,-                          | 3,10/7,-                       | 6                 | 7 + W10 + W27 + W15§                          |
| S 930     | 1,3/5,12                          | W28,-/W5,7                     | 9                 | 7 + W10 + W27 + W15§                          |
| S 1021    | 2,-/W5,-                          | 2,3/7,-                        | 7                 | 7 + W27 + (W10)                               |
| S 1044    | 2,-/W5,-                          | 2,-/8, W10                     | 4                 | 7 + W10 + W27 + 13                            |
| S 1060    | 9,-/5,12                          | 2,9/7,-                        | 6                 | 7 + W10 + W27 + W15 <sup>+</sup>              |
| S 1196    | W32/5,-                           | 1,2/8, W10                     | 7                 | 7 + W10 <sup>+</sup> + W15 + Gi1 <sup>+</sup> |
| S 1214    | 1,10/8, W17                       | 2,-/7, W10                     | 2                 | 7 + W10 <sup>+</sup>                          |
| S 1223    | 1,2/8, SL                         | 2,(10)/7,13                    | 4                 | 7 + W10 + W27                                 |
| S 1251    | 2,-/W5, W18                       | 2,-/7,8                        | 2                 | 7 + W10                                       |
| S 1254    | W32,11/W5,-                       | 3,-/W27,-                      | 3                 | 7 + W27                                       |
| S 1008    | 9,-/W5,-                          | 1,2/8, W10                     | 6                 | 7 + (W10) + 8 + W14                           |

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp<br>des Serumsenders | HL-A-Phänotyp<br>des Ehemannes | Zahl der<br>Eluate | Antikörperspezifität |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| S 977     | 1,3/5, W14                        | 2,-/W15, W18                   | 4                  | Gt1 <sup>+</sup>     |
| S 1215    | 2,-/12,-                          | 1,2/8, W15                     | 6                  | Gt1                  |
| S 1206    | 10,-/W10, W22                     | -, -/7, W5                     | 4                  | W5                   |
| S 1218    | 3,11/7,-                          | -,11/12,-                      | 5                  | 12 + 13 + W27        |
| S 1225    | 1,3/7,-                           | 2,-/12, W17                    | 5                  | W17 <sup>+</sup>     |
| S 1248    | 1, W28/5,-                        | 2,-/W15,-                      | 5                  | W15 + W22            |
| S 999     | 3,11/7, 12                        | 3,-/7,-                        | 1                  | 8                    |
| S 1148    | n.b.                              | n.b.                           | 1                  | 8                    |
| S 948     | 2,-/7, W5                         | (W28), W32?/W14,<br>W18?, W17? | 7                  | 8 + W14              |

Tabelle IV: Kreuzreaktionen von 38 Antiseren und ihren Eluaten (N = 209) gegen HL-A-Antigene der zweiten Serie, RENAP-Phänomene mit eingeschlossen (in Klammern).

+ Antiseren enthalten auch Antikörper gegen HL-A-Antigene des ersten Locus.

§ Patienten erhielten Bluttransfusionen, zusätzliche Immunisierung möglich.

n.b. = nicht bestimmt.

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp<br>des Serumspenders | HL-A-Phänotyp<br>des Ehemannes | Zahl der<br>Eluate | Antikörperspezifität |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| S 943     | 2,3/7,-                            | W28,9/-,-                      | 7                  | polyspezifisch       |
| S 1055    | 2,11/7,-                           | 2,9/W14,-                      | 17                 | -"-                  |
| S 1113    | 2,-/W14,-                          | (10),-/W18,-                   | 6                  | -"-                  |
| S 1168    | 9,-/W17,-                          | 2,-/W15,-                      | 7                  | -"-                  |

Tabelle V: Vier Antisera mit polyspezifischer Reaktion


| kreuzreagierende<br>Spezifität | N  | 5  | W17 | W5 | W15 | 13 | 12 | Gi3 | Gi1 | W27 | W10 | 7  | W22 | 8  | W14 |
|--------------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 5                              | 33 |    | 24  | 21 | 12  | 12 | 9  | 6   | 6   | 6   | 3   |    |     |    |     |
| W17                            | 30 | 27 |     | 17 | 13  | 13 | 10 | 7   | 3   | 3   | 7   |    |     |    |     |
| W5                             | 27 | 26 | 19  |    | 19  | 15 | 11 | 4   | 4   |     | 4   |    |     |    |     |
| W15                            | 34 | 12 | 12  | 15 |     | 9  | 9  | 3   | 3   | 9   | 15  | 12 | 3   |    |     |
| 13                             | 30 | 13 | 13  | 13 | 10  |    | 20 | 3   |     | 10  | 13  | 3  |     |    |     |
| 12                             | 26 | 12 | 12  | 12 | 12  | 23 |    | 4   |     | 12  | 12  | 4  |     |    |     |
| Gi3                            | 9  | 22 | 22  | 11 | 11  | 11 | 11 |     | 11  |     |     |    |     |    |     |
| Gi1                            | 8  | 25 | 13  | 13 | 13  |    |    | 13  |     |     | 13  | 13 |     |    |     |
| W27                            | 27 | 7  | 4   |    | 11  | 11 | 11 |     |     |     | 26  | 30 |     |    |     |
| W10                            | 33 | 3  | 6   | 3  | 15  | 12 | 9  |     | 3   | 21  |     | 27 |     |    |     |
| 7                              | 26 |    |     |    | 15  | 4  | 4  |     | 4   | 31  | 35  |    |     | 4  | 4   |
| W22                            | 1  |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |    |     |    |     |
| 8                              | 3  |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | 33 |     |    | 67  |
| W14                            | 3  |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     | 33 |     | 66 |     |

Tabelle VI: Gemeinsames Auftreten von Antikörperspezifitäten der zweiten Serie in Prozenten ausgedrückt.  
N ist die Gesamtheit der Antikörperkomplexe aus allen Seren und Eluat, die die links aufgeführte Spezifität enthalten.

HL-A-Antigene des zweiten Locus

| 5 | W17 | W5 | W15 | 13 | 12 | Gi3 | Gi1 | W27 | W10 | 7 | W22 | 8 | W14 |     |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|
| 8 | 7   | 4  | 4   | 4  | 3  | 2   | 2   | 2   | 1   | - | -   | - | -   | 5   |
|   | 5   | 4  | 4   | 4  | 3  | 2   | 1   | 1   | 2   | - | -   | - | -   | W17 |
|   |     | 5  | 4   | 4  | 3  | 1   | 1   | -   | 1   | - | -   | - | -   | W5  |
|   |     |    | 3   | 3  | 3  | 1   | 1   | 3   | 5   | 4 | 1   | - | -   | W15 |
|   |     |    |     | 6  | 1  | 1   | -   | 3   | 4   | 1 | -   | - | -   | 13  |
|   |     |    |     |    | 1  |     | -   | 3   | 3   | 1 | -   | - | -   | 12  |
|   |     |    |     |    |    |     | 1   | -   | -   | - | -   | - | -   | Gi3 |
|   |     |    |     |    |    |     |     | -   | 1   | 1 | -   | - | -   | Gi1 |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     | 7   | 8 | -   | - | -   | W27 |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     |     | 9 | -   | - | -   | W10 |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     |     |   | -   | 1 | 1   | 7   |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     |     |   | -   | - | -   | W22 |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     |     |   |     | - | 2   | 8   |
|   |     |    |     |    |    |     |     |     |     |   |     |   |     | W14 |

Tabelle VII: Frequenz von Kreuzreaktionen zwischen Antigenen des zweiten Locus.



Figur 1: Kreuzreaktionen von 35 Antisera und ihren Eluaten (N=91) ohne RNEP-Phänomene gegen HL-A-Antigene der zweiten Serie. Jeder waagerechte Streifen bedeutet eine Spezifität. Oben die Antigene der zweiten Serie, rechts die Anzahl der Seren und/oder Eluate, die die betreffende Spezifität enthalten.

| 1 | 2 | W28 | 3 | 9 | 10 | 11 | S<br>(N) | E<br>(N) |
|---|---|-----|---|---|----|----|----------|----------|
|   |   |     |   |   |    |    | 1        | 2        |
|   |   |     |   |   |    |    | 3        | 4        |
|   |   |     |   |   |    |    | 6        | 14       |
|   |   |     |   |   |    |    | 1        | 0        |
|   |   |     |   |   |    |    | 0        | 2        |
|   |   |     |   |   |    |    | 3        | 5        |

Figur 2: Kreuzreaktionen von 14 Antisera und ihren Eluat (N=27) ohne RNEP-Phänomene gegen HL-A-Antigene der ersten Serie. Erklärungen siehe Figur 1.

### 1.a) Quantifizierung der Kreuzreaktionen

Es wurde eine Quantifizierung der Kreuzreaktionen durch Cluster-Analysen versucht (R.G. DAVIES: "Single linkage cluster analysis" aus: Computer programming in quantitative biology (1971), London, New York). In die Betrachtung wurden zusätzlich miteinbezogen 600 Schwangerenseren, über die im einzelnen in der Dissertation von Bernd LANGE, Gießen 1973 berichtet wird. Es wurden nur Seren von  $N \geq 5$  beurteilt (gemeinsames Merkmal innerhalb einer Gruppe: ein HL-A-Antigen der Spenderin). Die iterativ errechneten Cluster wurden inhaltlich zu interpretieren versucht, dabei zeigten sich bei den einzelnen Serengruppen die unten aufgeführten inhaltlich interpretierbaren Gruppierungen (Tab. VIII).

| Gruppe von Seren, deren Spender das aufgeführte Antigen besitzen | Ähnlichkeit zwischen | Ähnlichkeitsniveau |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| W5                                                               | 7, W10               | 0,70               |
| 8                                                                | 12, 13, W27          | 0,80               |
| 7                                                                | 12, 13               | 1,0                |
| 12                                                               | 12, 13               | 1,0                |
| 12                                                               | 7, W10, W27          | 1,0                |
| 5                                                                | 5, W21               | 1,0                |
| 5                                                                | W17, 12, 13          | 1,0                |

Tabelle VIII

Allgemeine Interpretation: Der Ähnlichkeitskoeffizient sagt aus, in welchem Umfang Variable miteinander auftreten. Er variiert zwischen 0 und +1 und ist in etwa vergleichbar mit einem Maß wie dem des Korrelationskoeffizienten.

Inhaltliche Interpretation: Unter dem Vorbehalt der Schwierigkeit beim Übergang statistischer Aussagen über das gemeinsame Auftreten von Kreuzreaktionen zu inhaltlichen Aussagen über Antigenähnlichkeiten. Viermal wird bestätigt die Ähnlichkeit zwischen 12 und 13, die beide zum einen W17 ähneln, zum anderen W27 nahestehen. Über dieses stehen 7 und W10, welche auch untereinander ähnlich sind, mit 12 und 13 in Verbindung.

Es ist interessant, daß W21 und W17, die früher zusammen mit CM und SL<sup>+</sup> als SL bezeichnet wurden, sich auch hier unähnlich darstellen: W17 scheint der Siebener-Gruppe ähnlicher zu sein, als dies für W21 gilt, W21 wiederum ähnelt der Fünfer-Gruppe eher, als es W17 tut.

Diese Darstellung der Kreuzreaktionen, die sich auf die Auswertung von 83 Seren stützt, kann aufgrund des relativ geringen Umfangs des Testmaterials nicht vollständig sein. Dies ist auch eine Antwort auf die Frage, wieso zwischen serologisch nicht identischen Spezifitäten ein Ähnlichkeitskoeffizient = 1 angegeben werden kann.

## 2. Beziehung zwischen Antigen-Milieu und Spezifität des Antikörpers

Die Tabellen IX und X zeigen die Abhängigkeit der Antikörperspezifitäten der zweiten Serie vom HL-A-Phänotyp der Serumspender. Die Zahlen wurden nicht nach den Gen-Frequenzen standardisiert, und alleine gesehen sind sie nicht sehr aussagekräftig. Faßt man sie aber mit Tabelle VI zusammen, so läßt sich wenigstens die Tendenz ablesen: je höheren Anteil ein Antigen A an den Kreuzreaktionen eines Antigens B hat, desto geringer ist die Neigung eines Antigen-B-Trägers, Anti-A zu bilden. Oder anders ausgedrückt: ein Maß für die Kreuzreaktion zwischen A und B ist die Fähigkeit von B, seinen Träger zu hindern, Anti-A zu produzieren und umgekehrt.

So reagieren z.B. die Glieder der Gruppen 5, W17, W5 und W27, W10, 7 kaum miteinander kreuz. Träger von Antigenen der einen Gruppe bilden aber schwerpunktmäßig Antikörper gegen Antigene der anderen. Ein anderes Beispiel: HL-A 8 reagiert selten kreuz. HL-A 8-Träger werden von den meisten anderen Antigenen fast einheitlich stark immunisiert.

So gelesen gibt die Tabelle Hinweise auf zwei Sachverhalte:

- a) W14-Träger produzieren keine Antikörper gegen Antigene der Gruppe 7, W10, W27. Dies bestätigt die Kreuzreaktion  $7 \times 8 \times W14$ , die in Serum 1008 gefunden wurde.
- b) HL-A 12 und noch mehr HL-A 13 scheinen der Fünfer-Gruppe eher verwandt zu sein als der Siebener-Gruppe.

Um die Sicherheit dieser Sätze zu erhöhen, wäre es nötig, eine Tabelle zu erstellen nach den Typisierungsergebnissen von einer noch größeren Anzahl immunisierter Frauen.

Bei der ersten Serie lassen sich Kreuzreaktionen wegen der kleinen Zahlen schlecht ablesen. Man sieht deutlich nur, daß Anti-HL-A 2 der häufigste Antikörper ist, HL-A 2 tragende Frauen nur in einem Fall einen Antikörper gebildet haben von 204 theoretisch möglichen Fällen (Antigenfrequenz 51,7 %). Dies könnte dafür sprechen, daß HL-A 2 eine sehr komplexe Struktur ist.

| HL-A-Antigene der Serumsponder<br>auf dem ersten Sublocus |  | Antikörper-Spezifitäten gegen HL-A-Antigene der ersten Serie |   |     |     |   |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|----|----|--|--|
|                                                           |  | 1                                                            | 2 | W28 | Gi2 | 3 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1                                                         |  | -                                                            | 3 | 3   | -   | - | 1 | -  | -  |  |  |
| 2                                                         |  | -                                                            | - | -   | -   | - | 1 | -  | -  |  |  |
| W28                                                       |  | 1                                                            | - | -   | -   | - | - | -  | -  |  |  |
| Gi2                                                       |  | -                                                            | 2 | 1   | -   | - | - | -  | -  |  |  |
| 3                                                         |  | -                                                            | 4 | 3   | -   | - | 2 | -  | -  |  |  |
| 9                                                         |  | 1                                                            | 2 | 1   | -   | 1 | - | -  | 1  |  |  |
| 10                                                        |  | -                                                            | 2 | 2   | -   | - | - | -  | -  |  |  |
| 11                                                        |  | -                                                            | - | -   | -   | - | - | -  | -  |  |  |
| "X"                                                       |  | -                                                            | 3 | 2   | -   | 1 | 2 | -  | 1  |  |  |

Tabelle IX: Beziehung zwischen HL-A-Phänotypen der Serumsponder und Antikörperspezifität gegen Antigene der ersten Serie. Erklärung siehe Tabelle VI. a)

Antikörperspezifität gegen HL-A-Antigene der zweiten Serie

| HL-A-Antigene der Serumsponder | 5 | W17 | W5 | W15 | 13 | 12 | Gi3 | Gi1 | W27 | W10 | 7 | W22 | 8 | W14 |
|--------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|
| 5                              | - | -   | -  | 3   | -  | -  | -   | 2   | 1   | 2   | 2 | 1   | - | -   |
| W17                            | - | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -   | -   | 1   | 1 | -   | - | -   |
| W5                             | - | -   | -  | -   | 1  | 1  | -   | -   | 4   | 3   | 7 | -   | 2 | 2   |
| W15                            | 1 | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| 13                             | - | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -   | 1   | 1   | 1 | -   | - | -   |
| 12                             | 1 | -   | -  | 1   | -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | 1 | -   | 1 | -   |
| Gi3                            | - | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| Gi1                            | 1 | -   | 1  | 1   | 1  | 1  | -   | -   | -   | 1   | 1 | -   | - | -   |
| W27                            | 1 | -   | 1  | 1   | 1  | 1  | -   | -   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| W10                            | 2 | 1   | 3  | -   | 1  | -  | -   | -   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| 7                              | 5 | 5   | 3  | 2   | 3  | 3  | 2   | 2   | 2   | 1   | - | -   | 1 | -   |
| W22                            | - | -   | 1  | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| 8                              | 2 | 2   | -  | -   | 1  | 1  | 1   | 1   | 2   | 3   | 2 | -   | - | -   |
| W14                            | 1 | 1   | 1  | 1   | -  | -  | -   | 1   | -   | -   | - | -   | - | -   |
| SL                             | 1 | -   | 1  | -   | -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | 1 | -   | - | -   |
| "X"                            | 4 | 4   | 3  | 3   | 4  | 3  | 1   | 2   | 4   | 2   | 5 | 1   | 1 | 1   |

Tabelle X: Beziehung zwischen HL-A-Phänotypen der Serumsponder und der Antikörperspezifität gegen Antigene der zweiten Serie. Für jede Person wurden beide Antigene aufgeführt bzw. in unsicheren Fällen alle vermuteten Spezifitäten. Unter "X" stehen die Reaktionen, wo die Antigene der Serumsponder nicht bestimmbar waren.

### 3. RNEP-Phänomen

Antikörper bestimmter Spezifität können manchmal auch mit Plättchen von solchen Spendern absorbiert und eluiert werden, deren Lymphozyten im Originalserum nicht reagierten. Dieses RNEP-Phänomen wiesen knapp die Hälfte der 43 eluierten Seren auf: fünf Seren in acht Eluatn bei Antigenen des 1. Locus, 16 Seren in 22 Eluatn bei Antigenen des 2. Locus. Tab. XI und XII zeigen, wie sich die RNEP-Phänomene auf die einzelnen Antigene verteilen. Dabei sind besonders zu erwähnen Serum 1196, wo ein Eluat der Spezifität 2xW28 mit einer Zelle 1, < W19 hergestellt wurde, sowie das Serum 1214, bei dem ein Anti-HL-A 2 von einer Zelle mit (3,11) absorbiert und eluiert wurde. Die seltenen Fälle, wo beim Immunogen selbst das RNEP-Phänomen auftritt, sind in Tabelle XIII zusammengefaßt.

| Spezifität der Eluate  | eluiert<br>von Antigen      | Eluat-<br>Nr. | Serum-<br>Nr. |
|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 5                      | (W27, <u>W15</u> )          | E 642         | S 960         |
| 5                      | (W5, <u>W15</u> )           | E 945         | S 960         |
| 5 + W17                | (12, <u>Gi3</u> )           | E 456         | S 919         |
| 5 + W17                | (7, <u>Gi3</u> )            | E 342         | S 1054        |
| 5 + W17                | (W15, -)                    | E 950         | S 1079        |
| 5                      | (7, <u>Gi3</u> )            | E 345         | S 1126        |
| 5                      | (7, <u>W5</u> )             | E 369         | S 1126        |
| 5                      | ( <u>W5</u> , 8)            | E 471         | S 1220        |
| 5 + W17 + Gi1 + Gi3    | (12, <u>W10</u> )           | E 636         | S 1079        |
| 5 + W5 + W15 + 12 + 13 | (7, <u>Gi3</u> )            | E 576         | S 1126        |
| 7                      | (13, <u>W10</u> )           | E 239         | S 907         |
| 7                      | ( <u>W10</u> , -)           | E 240         | S 907         |
| 7                      | (8, <u>W15</u> )            | E 241         | S 907         |
| 7                      | ( <u>W27</u> , <u>W17</u> ) | E 242         | S 907         |
| 7                      | (13, <u>W10</u> )           | E 255         | S 1021        |
| 7 + W10                | (8, <u>W15</u> )            | E 356         | S 1060        |
| 7 + W10                | (5, <u>W27</u> )            | E 357         | S 1060        |
| 7 + W10                | (8, <u>W15</u> )            | E 367         | S 1196        |
| 7 + 8 + W14            | (12, <u>W10</u> )           | E 715         | S 1008        |
| W27                    | (7, <u>SL</u> )             | E 483         | S 1254        |
| W22                    | (7, <u>W15</u> )            | E 768         | S 1248        |
| W27 + W17 + 12 + 13    | (8, <u>W15</u> )            | E 249         | S 1012        |

Tabelle XI: RNEP-Phänomene von Antiseren gegen HL-A-Antigene der zweiten Serie. Unterstrichen sind die vermutlich absorbierenden Antigene.

| Spezifität<br>der Eluate | eluiert von<br>Antigen | Eluat-Nr. | Serum-Nr. |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1                        | (2,9)                  | E 1083    | S 1291    |
| 1                        | (2, <u>10</u> )        | E 1084    | S 1291    |
| 1                        | (3, <u>11</u> )        | E 1085    | S 1291    |
| 2 + W28                  | (1,(< <u>W19</u> )     | E 368     | S 1196    |
| 2                        | (3,11)                 | E 465     | S 1214    |
| 9                        | ( <u>2</u> ,3)         | E 544     | S 1282    |
| 9                        | ( <u>2</u> ,11)        | E 447     | S 1079    |
| 9                        | ( <u>2</u> ,10)        | E 637     | S 1079    |

Tabelle XII: RNEP-Phänomene von Antiseren gegen HL-A-Antigene der ersten Serie. Unterstrichen sind die vermutlich absorbierenden Antigene.

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp<br>des Ehemannes | Spezifität<br>des Original-<br>serums und<br>der Eluate | Antigen<br>mit<br>RNEP | Besonderes                                                                                                |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1079      | 1,2,W5,(12)                    | 9                                                       | 2                      |                                                                                                           |
| 960       | 2,-/W27,W17                    | 5                                                       | W27<br>(W15?)          | nicht ge-<br>sichert, da<br>die Elutazelle<br>2,3/W27,W15<br>trug (Kreuz-<br>reaktion 5 -<br>W15 möglich) |
| 1215      | 1,2/8,W15                      | Gi 1                                                    | n.b.                   |                                                                                                           |

Tabelle XIII: RNEP-Phänomen bei dem Immunogen.  
Aufgeführt sind nur die Fälle, wo bei den  
Ehemännern auf dem entsprechenden  
Locus zwei Antigene bestimmt waren.

#### 4. Antikörper-Verbreiterung in den Eluaten

Durch die Anreicherung des Antikörpers in den Eluaten erwiesen sich acht Antikörper als multispezifischer als im Originalserum. Dabei kam in vier Seren eine W15-Komponente zum Vorschein (Tab. XIV).

| Serum-Nr. | Spezifität des Originals | Spezifität der Eluate         | Locus |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1272      | 2                        | 2 x <u>W28</u>                | 1     |
| 1126      | 5 x 12                   | 5 x 12 x <u>13 x W5 x W15</u> | 2     |
| 1054      | 5 x SL x W5              | 5 x SL x W5 x <u>13</u>       | 2     |
| 1012      | W27 x 13 x 12x SL        | W27x13x12xSLx5(xW10)          | 2     |
| 1106      | W15xSLx12x13xW5          | W15xSLx12x13xW5x5xW10         | 2     |
| 1196      | 7 x W10                  | 7 x W10 x <u>W15</u>          |       |
| 908       | 7 x W27 x W10            | 7xW27 xW10xW15xW22            | 2     |
| 1060      | 7 x W27 x W10            | 7 x W27 x W10 x <u>W15</u>    | 2     |

Tabelle XIV: Verbreiterung der Antikörper-Spezifität in den Eluaten.

#### 5. Antikörperspezifität vor und nach der Entbindung

Tabelle XV faßt die Veränderungen der Antikörperspezifität innerhalb weniger Wochen zusammen. Insgesamt waren es 13 Seren, die breiter wurden, zwei Seren deren Reaktionsspektrum sich verschmälerte. Die Antikörper gegen Antigene der ersten Serie reagierten im Höchstfall mit drei Antigenen kreuz, während bei der zweiten Serie Antikörper gegen sechs kreuzreagierende Antigene vorkamen. Eine klare Tendenz bei Multiparae, multi-spezifischer als Primiparae zu reagieren, fand sich allerdings nicht. Polyspezifisch reagierten dreimal zweite Parae, einmal eine dritte Para, zweimal zweite Parae, fünfmal dritte und Multiparae.

Es wurde kein einziges Serum gefunden, das bei der zweiten Blutentnahme negativ war. Die längste Persistenz eines Antikörpers Serum 977 mit einem Jahr nach der Entbindung (in Tabelle XV nicht aufgeführt, da Spezifität vor und nach der Entbindung unverändert).

| Serum-Nr. | Spezifität vor der Entbindung | zusätzliche Spezifität nach der Entbindung | zeitliches Intervall zwischen den Blutentnahmen |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 907       | 7                             | x ?                                        | 4 Wochen                                        |
| 1060      | 7 x W27                       | W10                                        | 6 Wochen                                        |
| 1254      | 7 x W27                       | (7) x (W27) !                              | 4 Wochen                                        |
| 930       | 7 x W10 x W27                 | W15                                        | 12 Wochen                                       |
| 1223      | 7 x W10 x W27                 | 7x(W10)x(W27) (!)                          | 16 Wochen                                       |
| 1012      | W27 x 12 x 13                 | SL                                         | 6 Wochen                                        |
| 1044      | W10 x 13                      | 12 x 7                                     | 4 Wochen                                        |
| 919       | 5                             | W17                                        | 9 Wochen                                        |
| 955       | W15 x 5 x W5                  | W17 x 13                                   | 7 Wochen                                        |
| 1220      | 5                             | x ?                                        | 32 Wochen                                       |
| 1054      | 5 x SL                        | W5                                         | 10 Wochen                                       |
| 1206      | W5                            | x ?                                        | 10 Wochen                                       |
| 1008      | 8 x W14                       | 7                                          | ?                                               |
| 1272      | 2                             | x ?                                        | 3 Wochen                                        |

Tabelle XV: Veränderung der Antikörper-Spezifität zwischen zwei Blutentnahmen vor und nach der Entbindung.  
(!) steht bei Titerabfall oder/und engerer Spezifität als vorher.

## 6. Monospezifische Seren

Von neun Seren waren sämtliche Eluate monospezifisch (Tab. XVI). Sie stammten dreimal von Primiparae, dreimal von zweiter Parae und dreimal von dritter Parae. Sechs weitere monospezifische Seren reagierten bi- und oligispezifisch in den Eluat.

| Serum-Nr. | HL-A-Phänotyp d. Serumspenders | HL-A-Phänotyp d. Ehemannes | Spezifität | Zahl der Eluate | Sublocus |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------|
| 1240      | 3,-/5,7                        | 3,9/7,W5                   | 9          | 5               | 1        |
| 1256      | 3,9/W10,-                      | -, -/W5,12                 | 2          | 4               | 1        |
| 1176      | Gi2,-/5,(W5?<br>12?)           | 2,-/5,12                   | 2          | 3               | 1        |
| 977       | 1,3/5,W14                      | 2,-/W15,W18                | W18        | 4               | 2        |
| 999       | 3,11/7,12                      | 3,-/7,-                    | 8          | 1               | 2        |
| 1148      | ?                              | ?                          | 8          | 1               | 2        |
| 1206      | 10,(11?)/W10<br>(7?, W22?)     | -, -/7,W5                  | W5         | 4               | 2        |
| 1215      | 2,-/12,W17                     | 1,2/8,W15                  | W18        | 6               | 2        |
| 1225      | 1,3/7,-                        |                            | W17        |                 | 2        |

Tabelle XVI: Seren, die im Original und den Eluaten monospezifisch reagierten.

#### 7. Beziehung zwischen dem Auftreten von HL-A-Zytotoxinen und der Zahl von Schwangerschaften und Geburten

Das vorliegende Untersuchungsgut zeigt eine signifikante Häufigkeitszunahme der HL-A-Zytotoxine mit steigender Schwangerschafts- und Geburtenzahl (vgl. Tab. XVII und XVIII).

$$\chi^2 = 9,52 \quad (3; 0,05) \quad \text{und} \quad \chi^2 = 8,093 \quad (3; 0,05).$$

Der Kontingenzkoeffizient für die Einteilung nach Schwangerschaften ( $C = 0,15$ ) lag leicht über dem für die Aufschlüsselung nach Geburten ( $C = 0,14$ ).

8. Die statistische Auswertung der Abort-, Transfusions- und Frühgeburts-Anamnese scheiterte an dem zu kleinen Umfang des Untersuchungsmaterials.

Die Tabellen XIX bis XXII zeigen die absoluten Zahlen.

| Schwangerschaftszahl           | 1   | 2  | 3  | 4-10 |
|--------------------------------|-----|----|----|------|
| Frauen mit<br>HL-A-Zytotoxinen | 19  | 17 | 12 | 5    |
| Frauen ohne<br>HL-A-Zytotoxine | 151 | 84 | 40 | 68   |

Tabelle XVII: Häufigkeit von HL-A-Zytotoxinen bei schwangeren Frauen nach Schwangerschaften aufgeschlüsselt.

| Anzahl der Geburten            | 0   | 1  | 2  | 3-10 |
|--------------------------------|-----|----|----|------|
| Frauen mit<br>HL-A-Zytotoxinen | 23  | 14 | 12 | 3    |
| Frauen ohne<br>HL-A-Zytotoxine | 161 | 94 | 30 | 13   |

Tabelle XVIII: Häufigkeit von HL-A-Zytotoxinen bei schwangeren Frauen nach Anzahl der Geburten aufgeschlüsselt.

| Schwangerschaftszahl               | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6-10 |
|------------------------------------|----|----|----|---|---|------|
| Patientinnen mit-<br>Abortanamnese | 0  | 2  | 1  | 2 | 0 | 0    |
| Patientinnen ohne<br>Abortanamnese | 19 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2    |

Tabelle XIX: Abortanamnese von schwangeren Frauen mit HL-A-Zytotoxinen.

| Schwangerschaftszahl               | 1   | 2  | 3  | 4  | 5 | 6-10 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|---|------|
| Patientinnen mit<br>Abortanamnese  | 7   | 7  | 15 | 8  | 4 | 3    |
| Patientinnen ohne<br>Abortanamnese | 129 | 75 | 23 | 16 | 0 | 1    |

Tabelle XX: Abortanamnese von schwangeren Frauen ohne HL-A-Zytotoxine.

|                                           | Patientinnen mit<br>HL-A-Zytotoxinen | Patientinnen ohne<br>HL-A-Zytotoxine |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Patientinnen mit<br>Transfusionsanamnese  | 3                                    | 19                                   |
| Patientinnen ohne<br>Transfusionsanamnese | 45                                   | 240                                  |

Tabelle XXI: Transfusionsanamnese schwangerer Frauen mit und ohne HL-A-Zytotoxine.

| Patientinnen mit<br>Frühgeburten  | 0  | 2   |
|-----------------------------------|----|-----|
| Patientinnen ohne<br>Frühgeburten | 43 | 290 |

Tabelle XXII: Frühgeburten bei Patientinnen mit und ohne HL-A-spezifischen zytotoxischen Antikörpern.

#### 9. Zum Problem der Verwandtschaft zwischen HL-A 9 und HL-A 2

Zwecks Untersuchung einer besonderen Verwandtschaft zwischen den Antigenen HL-A 2 und HL-A 9 wurde ein Vergleich der Verteilung des Antigens HL-A 9 unter HL-A 2 negativen Frauen, die Anti-HL-A 2 produzierten oder andere Antikörper, angestellt (Tab. XXIII).

| Antigen     | Antikörper               |                         |       |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------|
|             | Anti-HL-A 2<br>vorhanden | Anti-HL-A 2<br>abwesend | Summe |
| HL-A 9 pos. | 2                        | 10                      | 12    |
| HL-A 9 neg. | 11                       | 22                      | 33    |

Tabelle XXIII

+ ) Unter Zuhilfenahme der Ergebnisse aus zusätzlich 600 Schwangerenseren, siehe Dissertation Bernd LANGE Gießen, 1963

Zwar ist der Anteil HL-A 9 positiver Frauen mit Anti-HL-A 2 an der Gesamtzahl der HL-A 9 positiven Frauen mit anderen Antikörpern relativ kleiner als der Anteil HL-A 9 negativer Frauen mit Anti-HL-A 2 an der Gesamtzahl der HL-A 9 negativen Frauen mit anderen Antikörpern, aber die Differenz der Verhältnisse 2 : 12 und 11 : 13 ist auf dem Niveau  $\alpha = 0,05$  nicht signifikant:

$$+)_z = 1,135; p = 0,129 > 0,05.$$

Daher widerspricht die statistische Auswertung dieses Materials der Hypothese von CULLEN und PICKLES (185), die, sich stützend auf eine signifikante Differenz zwischen diesen Verhältnissen, besagt, daß HL-A 9 im Laufe seiner molekularen Synthese ein HL-A 2-Stadium durchläuft. Dieses Ergebnis ist jedoch in Anbetracht der kleinen N-Zahl und trotz einer Endlichkeitskorrektur nicht stringend zu interpretieren.

### III. 1. Erläuterungen zu einzelnen Seren

#### a) oligospezifische Seren

Serum 907 (Tab. 1) zeigt ein Anti-HL-A 7, kreuzreagierend mit W27 (E242), W15 (E241, 940, 941) und W10 (E240). Die Kreuzreaktionen sind oft so schwach, daß sie als Extras (falsch positive Reaktionen) auftauchen. Es sind im großen und ganzen nur W27 und W15-Zellen, die zusätzlich reagieren, während W10 zytotoxisch überhaupt nicht beweisbar ist, sondern nur als RNEP-Phänomen.

Dieser Serograph bestätigt die häufige Beobachtung, daß das antikörperbildende Antigen auf einer absorbierenden Zelle den Antikörper in größerem Ausmaß zu binden vermag als die kreuzreagierenden Antigene (Absorbat 238 als einziges Absorbat negativ).

Serum 908 (Tab. 2) enthält ein Anti-HL-A 7 x W10 x W27 x W15, das höchstwahrscheinlich auch mit W18 kreuzreagiert (die Extrapositivitäten betreffen zum großen Teil W18). Die Spezifität W22 erscheint als RNEP-Phänomen. Es ist nach dem Muster der verwendeten Absorptionszellen nicht auszuschließen, daß auch HL-A 13 teil hat am Antikörper.

---


$$+)_z = \frac{p_1 - \pi - \frac{1}{2n}}{\frac{\pi(1-\pi)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}$$

Serum 919 (Tab. 3) hat zwei Antikörper: Anti W28 mit HL-A 2 und Anti-HL-A 5 mit W17 kreuzreagierend, wahrscheinlich auch mit W21, aber nicht mit W5 und W27 (E458, E459). Die auch im Serum 1043 vermutete Kreuzreaktion zwischen W21 und W17 wird an diesem Serum dadurch bestätigt, daß die Extrapositivitäten mit W21-Zellen nur in Eluat mit 5 W17-Spezifität auftauchen.

Serum 930 (Tab. 4): Die Spezifität des Antikörpers heißt 7 x W10 x W27 x W15. Es sieht so aus, als ob bei der Absorption 962 W5 die 7 absorbiert hat, da die 12 als absorbierendes Antigen im Hinblick auf die Typisierung der Ehefrau nicht in Frage kommt. Diese Kreuzreaktion wäre in Übereinstimmung mit einer alten Einteilung VAN ROODS von 1962, in der W5 und 7 zu 4b gehörte. Hier geht die Vermutung eher in die Richtung eines zytotoxisch negativen Antikörpers Anti W5, induziert vom W5 des Ehemannes, bei dessen Absorption Anti 7 unspezifisch miterfaßt wurde.

Eluat 244 mit dem Antikörper induzierenden Antigen 7 als absorbierendes und eluierendes Antigen enthält, als Ausnahme einer allgemeinen Regel, den Antikörper nicht in der stärksten Konzentration von allen anderen Eluat. Eluate mit W15 Zellen (E706 und E648; 4 Antikörperkomponenten, E246, 705; 2 Antikörperkomponenten) enthalten den Antikörper in sichtbar verschiedenen Konzentrationen, was wahrscheinlich mit der besonderen Komplexität von W15 zusammenhängt.

Serum 955 (Tab. 7) umfaßt die Komponenten 5 x W17 x W15 x W5, wahrscheinlich auch einen Teil der 12 und der 13 (siehe die Extrapositivität 2,9/12,W10 bei E228 und E448. Alle diese Komponenten außer der 12 und 13 sind durch Absorption und Elution bestätigt. Die 13 geht aus dem Eluat 643 nicht schlüssig als absorbierendes Antigen hervor. Ihre Reaktion in E644 ohne falsch negative Positivitäten läßt sie aber doch vermuten. Ein 12-Eluat ist negativ, hat aber 5 Extrapositivitäten und zwar 3mal mit W5, einmal mit 7, W15. Es dürfte der Antikörper in geringer Konzentration vorliegen. Die Absorbate sind negativ außer A645, das schwach und nicht auswertbar reagiert, aber immer innerhalb des Positivitätenspools der Eluate bleibt. Auch dieses Serum bestätigt die Kreuzreaktion W21-W17 (E955 mit der Extrapositivität 9, W32/7,W21). Vergleiche dazu S 1060.

Serum 960 (Tab. 8) ist ein Beispiel dafür, wie ein Antigen einen Antikörper induzieren kann, der zytotoxisch ausschließlich gegen ein anderes mit ihm kreuzreagierendes Antigen wirksam ist: das W27 oder W17 des Ehemannes regte die Bildung des

Antikörpers Anti-HL-A 5 an, der von einer Zelle mit W15, W27 absorbiert und eluiert werden kann (E945). Eluat 450 mit 2,11/5,7 zeigt eine 5 und W27-Spezifität. Ob diese W27-Komponente einen gleichzeitig vorliegenden zweiten Antikörper darstellt, der mit 7 kreuzreagiert und durch W27 induziert wurde oder die 5 der Eluatzeile nur eine stärkere Affinität zum Antikörper als andere Zellen hatte, ist ohne ein Eluat mit einer 7-Zelle ohne HL-A 5 nicht zu entscheiden.

Das Serum 977 (Tab. 9) enthält zwei Antikörper, von denen der eine, Anti-HL-A 2 x W28, schon im Original klar als solcher erscheint, während Anti-W18 nur an einer positiven Reaktion im Originalserum auffällt. Der Grund dafür ist, daß die anderen W18-Zellen der Testreihe gleichzeitig ein HL-A 2 tragen. Der Antikörper 2 x W28 läßt sich sowohl durch eine 2-Zelle als auch eine W28 absorbieren und eluieren (E452, E453).

Mit diesem Gießener Serum wurde unabhängig von anderen Arbeitsgruppen ein neues Antigen gefunden und erst später die Identität zwischen diesem Gießener Antigen und W18 festgestellt. Anti-W18 fällt in den Absorbaten A452 und A453 auf, die beide ein völlig identisches, diskretes Reaktionsmuster mit drei Zellen aufweisen, von denen die eine (1,9/W17, W18) schon von der Untersuchung des Originalserums bekannt war. Die Eluate E947 und E946 mit zweien dieser drei Zellen enthalten den W18-Antikörper, Eluat E946 zusätzlich 2 x W28.

Die Tatsache, daß sich Anti-W18 in den Absorbaten 452 und 453 absolut deutlich von Anti 2 x W28 abtrennen läßt, beweist, daß diese beiden nicht kreuzreagieren. Daß W18 ferner vom 2. Locus stammen muß, geht klar daraus hervor, daß manche der mit dem Antikörper reagierenden Zellen auf dem 1. Locus voll austypisiert sind, während sie allesamt einen freien Platz auf dem zweiten Locus haben.

Serum 1008 (Tab. 11): Der Antikörper 7 x 8 x W14 wird von folgenden Zellen absorbiert: 7, 13; W14, W18; 12, W10; 8, W15. Die denkbare, aber unwahrscheinliche Möglichkeit zweier nicht kreuzreagierender Antikörper 7 und 8 x W14 unter der Voraussetzung, daß gleichzeitig 8 x W14 mit 13 und W18 kreuzreagierte und 7 mit W15 ist allerdings nicht auszuschließen. Das Serum zeigt zum Teil schlechte  $\chi^2$ -Werte, zum größeren Teil wegen seiner zahlreichen Extrapositivitäten, zum kleinen Teil wegen falsch negativen Reaktionen, die am meisten 7 und W14 betreffen (das Immunogen ist 8!). Das Eluat 550 mit einer 7-Zelle zeigt auch dementsprechend den am schwächsten konzentrierten Antikörper.

Serum 1012 (Tab. 12): Unter den untersuchten Antikörpern der Fünfer-Gruppe ist dieser der einzige, in dem 5 x W27 kreuzreagieren. Allerdings hat die W27-Komponente manchmal keine signifikanten  $\chi^2$ -Werte, was aber nie zu Lasten von falsch negativen Reaktionen geht. Eluat 360 (2,11/5,7) mit den Spezifitäten W27,5,W17,13,12 kann nur auf die 5 zurückgehen, da die 7 als absorbierendes Antigen durch die Typisierung der Ehefrau ausgeschlossen ist. Die Kreuzreaktionen seien noch einmal anhand von Zellmuster und Eluatspezifität dargestellt:

| Eluatzell-<br>muster | Eluat | Eluatspezifität                |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| 5,7                  | 360   | W27, 5, W17, 13, 12, W18, W21  |
| W27,SL               | 562   | W27, 5, - - 12, W18, W21 (W10) |
| W18, 7               | 948   | W27, 5, - - 12, - W21          |
| 13, W15              | 638   | W27, 5, W17, 13, - W18, W21    |
| 2,-/12,-             | 640   | - - - - - - -                  |
| 13, W10              | 250   | W27, 5, W17, 13, 12, W18, W21  |
| W15,8                | 249   | W27, - W17, 13, 12, - -        |
| W27,W17              | 229   | W27, 5, W17, 13, 12, - W21     |

Es fällt auf, daß E640 (2,-/12,-) negativ ist, während die 12 in 6 von 7 positiven Eluaten vorkommt.

Bevor nicht ein Eluat mit einer W10-Zelle ohne W27,5,W17,13,12,W18 und W21 vorliegt, kann nicht entschieden werden, ob dieser Antikörperkomplex auch mit W10, dem zweiten Antigen des 2. Locus des Ehemannes kreuzreagiert oder nicht.

Bei Eluat 250 (1,-/13,W10) und E638 (2,-/13,W15 könnten sehr wohl auch W10 und W15 und nicht in beiden Fällen 13 absorbiert haben.

Serum 1021 (Tab. 13) enthält einen Antikörper der Siebener-Gruppe, der gegen HL-A 7 und W27 gerichtet ist, nicht aber gegen W15 (E254,716). Die Eluate 255 (1,-/13,W10: Anti7) und 552 (2,-/13,W15: negativ) lassen sich entweder so interpretieren, daß der Antikörper mit W10 sich absorbieren läßt oder daß die beiden 13-Antigene nicht identisch sind und der Antikörper sich an die 13 der Zelle 2,-/13,W15 nur in unscheinbaren Mengen bindet.

Serum 1043 (Tab. 14) enthält einen Komplex W17,5,W21,W5, 12,13,W15. Daneben liegt womöglich ein Anti-W17 vor, das mit kreuzreagiert. Der breitere Antikörper von beiden ist in sämtlichen Eluaten enthalten, seien sie mit 12-, W21-, W17- oder 5-Zellen hergestellt. In Eluat 232 und Eluat 486 scheint er allerdings um W5 x 12 bzw. nur W5 verschmälert, was aber nicht den Schluß auf einen besonderen Antikörper zuläßt. Vielmehr liegt es hier an der Vielfalt der Testzellreihen, die fast für jedes Eluat verschieden sind, daß nach Elimination der Zellen mit zwei Antigenen aus dem Antikörperspektrum in einzelnen Fällen eine Spezifität nicht mehr auswertbar ist und deshalb im Serographenschema nicht mehr erscheint.

Die Verschmälерung des Antikörpers in E 232 (W28,-/W5,12) ist zusätzlich noch auf die schwache Absorptionskraft dieser speziellen Zelle zurückzuführen.

Die Spezifitäten des zweiten Antikörpers W17 und W21 sind zwar schon im ersten breiten Antikörper eingeschlossen. Die gute Abtrennbarkeit der Spezifität W21 x W17 in Absorbat 486 (standardisiert<sup>†</sup>) und 344 legen aber die Vermutung nahe, daß es sich um einen separaten Antikörper handelt. Die Berücksichtigung der Typisierung des Ehepaares stärkt die Vermutung.

Serum 1044 (Tab. 15): Ein Anti-W10, das sowohl mit 7,W27 und andeutungsweise mit W15 und W21 kreuzreagiert, als auch mit 12 und 13. Angesichts der Zweifel, die in Bezug auf eine scharfe Trennung der kreuzreagierenden Gruppen existieren, wäre es interessant gewesen festzustellen, ob er auch mit der 5, an deren kreuzreagierendem Komplex auch die 12 und 13 beteiligt sind, kreuzreagiert (vgl. Serum 1126).

In den Eluaten 460 und 624 (1,2-fache Serummenge) ist ein Dosiseffekt zu beobachten: der Antikörper verbreitert sich von einem Anti-W10 x (7) x 13 zu einem Anti-W10 x 7 x 13 x W27 (x W15 x W21). Ein anderer Dosiseffekt liegt dem reinen Anti-W10 in Absorbat 461 zugrunde: wahrscheinlich liegt hier kein nicht kreuzreagierendes W10 vor, sondern die 13 war nicht imstande, den Antikörper völlig zu absorbieren, wie das W10 und die 12 in Absorbat 460 und 624, so daß im Lymphozytotoxizitätstest nur noch die stärkste Spezifität zu Tage tritt.

Bei dem Antikörper des Serums 1060 (Tab. 18) handelt es sich um einen der kreuzreagierenden Siebener-Gruppe, der von dem Antigen HL-7 induziert wurde. Das Gesamtspektrum des Antikörpers 7 x W10 x W27 x W15 erscheint in Eluaten von

---

<sup>†</sup>) Standardisierung der Absorbate: Das absorbierende Serum wird bis zu der Stufe verdünnt, die zwei geometrische Verdünnungsstufen über derjenigen liegt, in der das Serum noch 26 - 50 % der Lymphozyten tötet.

denjenigen Zellen, die entweder 7 oder W15 besitzen (E256: 2,-/5,7 und E235: 2,3/W27,W15) - W27 dürfte, berücksichtigt man das Eluat 257, wohl nicht für das einbezogene W15 verantwortlich sein -.

Erklärung: Das Immunogen und nahe verwandte Antigene auf der absorbierenden Zelle haben die größte Affinität zum Antikörper. Mit der Ähnlichkeit zum Immunogen fällt auch die Affinität zum Antikörper: Anti 7 x W10 x W27 ist in den vier Eluaten erfaßt, bei denen das absorbierende Zellantigen signifikante  $\chi^2$ -Werte im Original hat: E256 (2,-/5,7) mit  $\chi^2 = 27,54$ , E358 (2,9/12,W10) mit  $\chi^2 = 18,65$ , E235 (2,3/W27,W15) und E257 (2,9/W27,W17) mit  $\chi^2 = 9,64$ . Im Vergleich dazu: Anti-HL-A 7 x W10 findet sich in drei Eluaten mit Antigenen, denen im Durchschnitt niedrigere  $\chi^2$ -Werte zuzuordnen sind: E356 (1,<W19/8,W15), W15 ist im Original nicht da; E953 (1,9/W18,W17), auch W18 taucht im Original nicht auf und in den Eluaten nur als Extrapositivität.

Das Eluat 953 (1,9/W18, W17), das Anti-7 x W10 enthält, zeigt ein RNEP-Phänomen von W18, denn wäre W17 das absorbierende Antigen, hätte das Eluat wahrscheinlich niedrigere  $\chi^2$ -Werte.

Serum 1065 (Tab. 19): Dieses Serum hat drei Antikörper: Anti-HL-A 2,5 x W5 und Anti-W18. Nach den Eluaten E286 (2,3/W14,W18), E288 (2,3/5,12) und E289 (1,3/W5,-), die alle drei Anti-5, W5 und W18 enthalten, wäre möglich:

1. daß W18 und 5 und W5 kreuzreagieren,
2. daß W18 und 12 kreuzreagieren und 5 und W14 wie von TONGIO et al. (156) beschrieben.

Serum 1106 (Tab. 21) hat nach Serum 1012 den vielgestaltigsten Antikörper der Fünfer-Gruppe. Es bestärkt die Vermutung, daß W10 auch Ähnlichkeit mit der Fünfer-Gruppe haben kann.

Die beiden Eluate mit 13-Zellen (E348 und 352) enthalten das breiteste Spektrum des Antikörpers, d.h., daß die 13 dem Immunogen W15 nahe verwandt ist.

| Eluatzelle | Spezifität |     |    |    |     |   |     |     |     |
|------------|------------|-----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|
|            | W15        | W17 | 12 | 13 | W5  | 5 | W10 | W18 | W21 |
| 13,-       | +          | +   | +  | +  | +   | + | +   | +   | +   |
| W14        | +          |     |    |    |     |   | +   |     |     |
| W5,8       | +          |     |    |    |     |   |     |     |     |
| 7,13       | +          | +   | +  | +  |     | + | (+) | +   | +   |
| W18,W17    | +          | +   |    |    | +   |   | +   |     |     |
| W17,W14    | +          | +   |    |    |     |   | +   |     |     |
| 5,12       | +          | +   |    |    |     |   | +   |     |     |
| W5,7       | +          |     |    | +  |     |   | (+) |     |     |
| W27,W17    | +          | +   | +  | +  | (+) |   | +   |     |     |
| 8,W15      | +          | +   |    | +  | +   |   | +   |     |     |

Serum 1126 (Tab. 23) gibt ein Beispiel für einen Dosiseffekt: Der Antikörper, der im Originalserum wie ein Anti-HL-A 5 x 12 und in Eluat 345 wie ein Anti-HL-A 5 aussieht, entpuppt sich im Eluat 576 (mit der gleichen Zelle, aber der 1,4-fachen Serummenge hergestellt) als Anti-HL-A 5 x W5 x 12 x 13 x W15, der W17 nur deshalb nicht umschließt, weil die Spenderin selbst W17 besitzt. Je nachdem, in welcher Konzentration ein Eluat den Antikörper enthält, tritt eine Spezifität als Extra-positivität oder als gut konkordanter Antikörper auf.

In Serum 1196 (Tab. 27) liegt ein Anti-HL-A 2 x W28 vor, der mit Zellen mit 1,9 und 1, < W19 absorbiert werden kann (RNEP). Daneben gibt es ein Anti-HL-A 7 x W10 x W15 x W18. Die meisten Extrapositivitäten dieses zweiten Antikörpers treten mit der Eluatzelle 3,11/W10,W22 auf.

Serum 1206 (Tab. 28): Der Antikörper Anti-W5 zeigt ein "CYPAPEN"-Phänomen. Er ist zytotoxisch wirksam, während er von W5 zwar absorbiert, aber nicht eluiert wird (Absorption positiv, Elution negativ) - vgl. TONGIO et al. (181).

Serum 1218 (Tab. 31): Die Eluate E332, 533, 534 berechtigen zu der Annahme, daß ein kreuzreagierender Antikörper Anti-HL-A 12 x 13 x W27 vorliegt. Eluate 535 und 654 sind in diesem Sinne nicht zu verwerten, weil dabei W17 und W15 absorbiert haben können. E532 reagiert deshalb nur mit 12 allein, weil es mit einem 1:2 verdünnten Serum hergestellt wurde.

In Serum 1220 (Tab. 32) steht neben einem gut darstellbaren Anti-HL-A 5 x W5 ein Antikörper unbekannter Spezifität. Die relative Häufung der 10, W19,W32 Extrapositivitäten fällt auf.

Serum 1223 (Tab. 33): Es fällt auf, die geringe Breite des siebener Antikörpers in den Eluaten. Bei höherer Konzentration würden die Kreuzreaktionen sicherlich zum Vorschein kommen, so wie es sich in den Extrapositivitäten andeutet.

Serum 1247 (Tab. 36): Der Antikörper erscheint zytotoxisch als reines Anti-HL-A 3, das nicht kreuzreagiert, keine falsch positiven oder falsch negativen Reaktionen zeigt. Seine Anreicherung im Eluat 471 (3,-/W14,-) macht seine kreuzreagierende Eigenschaft sichtbar: sie tritt bei der Untersuchung des Eluats nur bei einer einzigen Reaktion zu Tage, nämlich bei einer Zelle, die eine 11 und keine 3 besitzt. Daß es sich hier um eine 11er-Spezifität handelt, zeigt auch das Eluat 959 (2,11/SL,W17): es enthält den Antikörper in seiner ganzen Breite. Die Möglichkeit, daß der Antikörper mit der 2 der Zelle reagiert haben könnte, ist weniger wahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß es weder im Originalserum noch im Eluat 417 einen Hinweis auf eine 2-Spezifität gab, stattdessen aber auf eine 11-Komponente.

Serum 1248 (Tab. 37): Das Originalserum ist polyspezifisch, während die 5 Eluate überraschenderweise einen relativ schmalen Antikörper W15 x W22 herauschälen. Die Spezifizierung der Antikörper im Original muß weiteren Absorptionen und Elutionen vorbehalten bleiben.

Serum 1251 (Tab. 38): Der Antikörper reagiert im Original außer mit 7 und W10-Zellen noch mit einer W15-Zelle. Die Eluate mit den Zellen (3, 10/W5, 7 und 2, 9/W10, 12) bieten ein reines Anti-7 x W10.

Serum 1254 (Tab. 39) enthält einen Antikörper, der, von W27 induziert, mit W27 stark und mit HL-A 7 schwächer reagiert. Er läßt sich von W27 auch besser als von 7 absorbieren; in E481 ist die W27-Spezifität deutlicher als in E483; der Verlust der 7 in E481 kommt daher, daß das Serum bei der Absorption 1:2 verdünnt war.

Das Anti-HL-A 2 des Serums 1256 (Tab. 40) läßt sich zwar absorbieren, aber nicht eluieren, vgl. Serum 1206. Der zweite Antikörper Anti-W5 reagiert kreuz mit HL-A 5 und nicht mit W17 und 12 (E728 und E960).

Serum 1282 (Tab. 42) hat zwei Antikörper:

1. ein Anti-HL-A 9, das sich an HL-A 2 absorbiert (E544: 2, 3/5, 12; die 3 ist unter Berücksichtigung des Eluates 545 (3, 11/7, W15) als absorbierendes Antigen auszuschließen).
2. Ein Anti-W15 x W15 x 5 x W5. Daß das Absorbat 544 ein reines W15 enthält, Absorbat 543 (1, 9/W17, W18) dagegen negativ ist, ist dadurch zu erklären, daß HL-A 5 im Vergleich mit W17 eine kleinere Struktur mit W15 gemeinsam hat, so daß die 5er-Zelle weniger Antikörper absorbiert als W17.

Serum 1291 (Tab. 43) zeigt ein RNEP-Phänomen zwischen HL-A 1 und 9; E1083 (2, 9/12, SL) enthält Anti-HL-A 1. Die Kreuzreaktion 2 x 1 ist unwahrscheinlicher als 1 x 9. Um sie abzusichern, müßte noch ein Eluat mit einer 2er-Zelle ohne HL-A 1, 9, 10, 11 gemacht werden.

#### b) monospezifische Seren

Zwei Seren fallen auf durch die Diskrepanz zwischen der Typisierung des Ehemannes und der Spezifität des Antikörpers: Beim Serum 999 mit einem Anti-HL-A 8 müßte, unter der Voraussetzung, daß keine außereheliche Schwangerschaft vorliegt, HL-A 8 auf den Zellen des Ehemannes so schwach sein, daß es zytotoxisch unwirksam bleibt und stark genug sein, um als Antigen zu wirken.

Bei Serum 1215 hat die Ehefrau ein Anti-W18 gebildet, das wahrscheinlich von W15 des Kindes induziert wurde. Das Eluat mit einer W15-Zelle bleibt allerdings negativ. Andere W15-Zellen wären zur Überprüfung heranzuziehen.

Tabelle 1

Serum: 907 - Frau: 2,9/W5,13 Mann: W28,-/7,8

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle                              | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten                                                      | N        | $\chi^2$       | r            | p                  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------------|
| S 907              |                                    | 7 + ?                  | 1, $\zeta$ W19/8, W15<br>2, 9/W27, W17<br>2, -/8, W27<br>2, W32/13, W10 | 32       | 28,00          | 0,81         | <0,0005            |
| A238<br>E238       | 2, -/5,7<br>2, -/5,7               | negativ<br>7 *, W27    | 2, -/8, W15<br>1, $\zeta$ W19/8, W15                                    | 24<br>24 | 16,38          | 0,77         | <0,0005            |
| A239<br>E239       | 1, -/13, W10<br>1, -/13, W10       | 7<br>W27               | 2, -/8, W15<br>1, $\zeta$ W19/8, W15                                    | 23<br>18 | 15,94<br>4,11  | 0,83<br>0,46 | <0,0005<br><0,05   |
| A246<br>E240       | 3, 11/W10, -<br>3, 11/W10, -       | 7<br>7 + ?             | 2, -/8, W15<br>1, $\zeta$ W19/8, W15                                    | 26<br>23 | 26,00<br>17,64 | 1,00<br>0,84 | <0,0005<br><0,0005 |
| A241<br>E241       | 1, 2/8, W15<br>1, 2/8, W15         | (7)<br>7 + ?           | 1, $\zeta$ W19/8, W15<br>2, -/8, W15                                    | 25<br>25 | 2,67<br>17,64  | 0,32<br>0,84 | <0,2<br><0,0005    |
| A242<br>E242       | W32, -/W27, W17<br>W32, -/W27, W17 | (7)<br>7 + ?           | 1, $\zeta$ W19/8, W15<br>2, -/8, W15                                    | 25<br>26 | 20,30<br>10,61 | 0,90<br>0,63 | <0,0005<br><0,0005 |
|                    |                                    | 7 + ?                  | 1, $\zeta$ W19/8, W15<br>2, -/8, W15                                    | 30       | 20,62          | 0,82         | <0,0005            |
|                    |                                    | 7 + ?                  | 1, $\zeta$ W19/8, W15                                                   | 26       | 18,48          | 0,84         | <0,0005            |

Serum: 907

Frau: 2,3/W5,13

Mann: W28,-/7,8

Tabelle 1

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p      |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|--------|
| A463               | 2,-/13,W15    | 7 x W10                |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | 0,0005 |
| E463               | 2,-/13,W15    | 7                      |                    | 19 | 19,00    | 1,00 | 0,0005 |
| E940               | 2,-/8,W15     | negativ                |                    | 13 | 13,00    | 1,00 | 0,0005 |
| E941               | 1,1/W19/8,W15 | negativ                | 2,11/5,7           | 23 |          |      |        |
|                    |               | negativ                | 2,-/8,W27          | 29 |          |      |        |
|                    |               | (7) + ?                | 1,11/W5,8          | 29 | 5,46     | 0,43 | 0,025  |
|                    |               |                        | 1,1/W19/8,W15      |    |          |      |        |
|                    |               |                        | 2,-/8,W27          |    |          |      |        |

Tabelle 2

| Serum: 908         | Frau: 2,-/12,- |                               | Mann: 3,10/7,-     |    |          |       |         |
|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----|----------|-------|---------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle          | Spezifität<br>Zytotox.        | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r     | p       |
| S 908              |                | 7xW10xW27<br>7<br>W10<br>W27  | 2,-/8, W15         | 37 | 22,95    | 0,78  | <0,0005 |
|                    |                |                               |                    | 33 | 28,87    | 0,93  | <0,0005 |
|                    |                |                               |                    | 24 | 15,27    | 0,79  | <0,0005 |
| E264               | 3,11/7, W15    | 7xW10xW27xW15x<br>W22         | 2,10/W14, W18      | 24 | 4,36     | 0,42  | <0,05   |
|                    |                |                               |                    | 27 | 17,53    | 0,80  | <0,0005 |
|                    |                | 7<br>W10<br>W27<br>W15<br>W22 | 3,-/W14,-          | 15 | 8,57     | 0,75  | <0,005  |
|                    |                |                               |                    | 8  | 1,90     | 0,487 | <0,2    |
|                    |                |                               |                    | 9  | 3,21     | 0,59  | <0,1    |
|                    |                |                               |                    | 12 | 6,12     | 0,71  | <0,025  |
| E265               | 2,9/12, W10    | 7xW10xW15xW22                 | 2,10/W14, W18      | 8  | 1,90     | 0,47  | <0,2    |
|                    |                |                               | 3,-/W14,-          | 27 | 15,56    | 0,75  | <0,0005 |
|                    |                | 7<br>W10<br>W15<br>W22        |                    | 18 | 11,52    | 0,80  | <0,001  |
|                    |                |                               |                    | 11 | 2,93     | 0,50  | <0,1    |
|                    |                |                               |                    | 14 | 4,38     | 0,558 | <0,05   |
|                    |                |                               |                    | 11 | 2,93     | 0,50  | <0,1    |
| E263               | 1,-/13, W10    | 7xW10xW15                     | 2,10/W14, W18      | 26 | 22,15    | 0,92  | <0,0005 |
|                    |                | 7<br>W10<br>W15               |                    | 19 | 15,35    | 0,89  | <0,0005 |
|                    |                |                               |                    | 12 | 5,45     | 0,67  | <0,025  |
|                    |                |                               |                    | 15 | 10,90    | 0,84  | <0,001  |
| E942               | 2,10/W14, W18  | 7 ?                           |                    | 29 | 18,98    | 0,80  | <0,0005 |
| E943               | 3,-/W14,-      | 7 ?                           |                    | 29 | 14,58    | 0,70  | <0,0005 |
| E944               | 1,3/8,-        | negativ                       | 3,10/7, W18        | 29 | -        | -     | -       |

Tabelle 3

Mann: W28, -/5, -

Frau: 9, 10/-, -

Serum: 919

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox.               | Extrapositivitäten            | N                                                                                                                                            | $\chi^2$                                                                                                                                                                                                                        | r                                                                                                                                                                                       | p                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S919               |               | 2+W28; 5+W17<br>2<br>W28<br>5<br>W17 | W32?, 9/W21, 7                | 34<br>30<br>15<br>18<br>16<br>25<br>24<br>13<br>24<br>25<br>20<br>10<br>10<br>11<br>25<br>24<br>18<br>24<br>22<br>21<br>24<br>24<br>12<br>23 | 30,06<br>26,21<br>6,96<br>13,37<br>9,90<br>25,00<br>24,00<br>13,00<br>13,00<br>20,91<br>16,29<br>4,44<br>4,44<br>6,51<br>9,41<br>8,39<br>8,47<br>$\emptyset$<br>13,02<br>9,90<br>6,30<br>$\emptyset$<br>24,00<br>12,00<br>23,00 | 0,94<br>0,93<br>0,67<br>0,86<br>0,78<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>0,91<br>0,90<br>0,66<br>0,66<br>0,76<br>0,6<br>0,58<br>0,68<br>0,73<br>0,67<br>0,54<br><br>1,00<br>1,00<br>1,00 | <0,0005<br><0,0005<br><0,01<br><0,0005<br><0,005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,05<br><0,05<br><0,02<br><0,005<br><0,005<br><0,005<br><br><0,0005<br><0,005<br><0,025<br><br><0,0005<br><0,001<br><0,0005 |
| E225               | W28, -/W5/12  | 2 + W28                              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A456               | 2, -/12, W21  | 5                                    |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E456               | 2, -/12, W21  | 2+W28; 5+W17<br>2<br>W28<br>5<br>W17 | 9, W32/7, W21                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S919 (1:4)         |               | 2 + W28                              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A457               | 3, -/W27, 5   | negativ                              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E457               | 3, -/W27, 5   | 5 + W17                              | 2, 9/W5, W21<br>W32, 9/7, W21 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E458               | 1, 11/W5, 8   | negativ                              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E459               | W28, -/W27, - | 2 + W28<br>2                         |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabelle 4

| Serum: 930         | Frau: 1,3/5,12 | Mann: -,W28/W5,7                        |                    |    |          |      |         |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle          | Spezifität<br>Zytotox.                  | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
| S930               |                | 7xW10xW27xW15<br>7<br>W10<br>W27<br>W15 | W28,-/W5,12        | 30 | 25,60    | 0,80 | <0,0005 |
| E648               | 2,-/8,W15      | 7xW10xW27xW15<br>7<br>W10<br>W27<br>W15 | 1,3/W5,-           | 26 | 12,82    | 0,70 | <0,0005 |
| E243               | 2,-/13,W15     | 7xW10,W27<br>7<br>W10<br>W27<br>W15     | 2,-/8,W15          | 19 | 14,18    | 0,86 | <0,0005 |
| E244               | 2,-/5,7        | 7xW10xW27<br>7<br>W10<br>W27            | 2,-/W15,8          | 17 | 10,57    | 0,78 | <0,005  |
| E245               | 3,11/W10,-     | 7xW10xW27xW15<br>7<br>W10<br>W27<br>W15 |                    | 17 | 3,76     | 0,46 | <0,1    |
|                    |                |                                         |                    | 17 | 6,02     | 0,59 | <0,025  |
|                    |                |                                         |                    | 34 | 29,95    | 0,93 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 28 | 22,90    | 0,90 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 23 | 10,97    | 0,63 | <0,001  |
|                    |                |                                         |                    | 27 | 17,89    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 24 | 20,30    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 19 | 15,23    | 0,89 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 14 | 8,55     | 0,78 | <0,005  |
|                    |                |                                         |                    | 15 | 10,31    | 0,82 | <0,005  |
|                    |                |                                         |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                |                                         |                    | 12 | 12,00    | 1,00 | <0,001  |
|                    |                |                                         |                    | 12 | 12,00    | 1,00 | <0,001  |
|                    |                |                                         |                    | 12 | 4,80     | 0,63 | <0,05   |

- Blatt 2 -  
 Serum: 930      Frau: 1,3/5,12      Mann: -,W28/W5,7      Tabelle 4

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox.        | Extrapositivitäten  | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----|----------|------|---------|
| E246               | 1,2/8,W15     | 7xW27xW10<br>7<br>W27,<br>W10 | 2,-/8,W15           | 22 | 11,73    | 0,73 | <0,001  |
|                    |               |                               |                     | 20 | 12,17    | 0,77 | <0,0005 |
|                    |               |                               |                     | 16 | 5,56     | 0,58 | <0,025  |
|                    |               |                               |                     | 15 | 2,68     | 0,41 | <0,02   |
| E247               | W32,-/W27,W17 | 7xW27<br>7                    |                     | 24 | 24,00    | 1,00 | <0,005  |
|                    |               |                               |                     | 21 | 21,00    | 1,00 | <0,005  |
|                    |               |                               |                     | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,005  |
| E962               | W28,W32/W5,12 | W27<br>7                      |                     | 28 | 22,90    | 0,90 | <0,005  |
| E705               | 1,4,W19/8,W15 | 7xW10<br>7                    | 1,3/W5,-<br>1,2/5,8 | 19 | 7,36     | 0,66 | <0,01   |
|                    |               |                               |                     | 17 | 3,76     | 0,46 | <0,10   |
|                    |               |                               |                     | 17 | 7,36     | 0,59 | <0,01   |
| E706               | 2,-/8,W15     | W10<br>7xW10xW15xW27<br>7     |                     | 24 | 20,16    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |               |                               |                     | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W10                           |                     | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W15                           |                     | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W27                           |                     | 16 | 7,46     | 0,68 | <0,01   |

Tabelle 5

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N | $\chi^2$ | r | p |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---|----------|---|---|
| S943               |               | polyspezifisch         |                    |   |          |   |   |
| E205               | 2,10/5,12     | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E206               | 9,W32/7,W21   | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E207               | 2,-/W15,-     | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E551               | W28,W32/W5,12 | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E707               | 1,9/W17,W18   | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E708               | 1,3/W5,W22    | -"-                    |                    |   |          |   |   |
| E709               | 2,-/13,-      | -"-                    |                    |   |          |   |   |

Spezifität  
Zytotox.

polyspezifisch

-"-

2,10/5,12

-"-

9,W32/7,W21

-"-

2,-/W15,-

-"-

W28,W32/W5,12

-"-

1,9/W17,W18

-"-

1,3/W5,W22

-"-

2,-/13,-

-"-

Tabelle 6  
Mann: (W28), W32? / W14, (W18?, W17?)

Frau: 2, - / 7, W5

Serum: 948

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox.         | Extrapositivitäten                                                          | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|---------|
| S948               |               | 8 + W14                        | 1,9/W17, W18<br>2, W32/13, W15<br>2,9/12, W10<br>2,10/7, 12<br>2,9/W27, W17 | 37 | 18,85    | 0,72 | <0,0005 |
| E455               | 3, - / W14, - | 8<br>W14                       |                                                                             | 35 | 16,77    | 0,86 | <0,0005 |
| E642               | 2,3/7, W18    | 8 + W14                        |                                                                             | 30 | 3,49     | 0,33 | <0,1    |
| E227               | 1,2/8, W15    | negativ<br>8 + W14<br>8<br>W14 |                                                                             | 23 | 23,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E710               | 2,10/7, 12    | negativ                        |                                                                             | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E711               | 2,9/12, W10   | negativ                        |                                                                             | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E712               | 3,11/7, W15   | negativ                        |                                                                             | 25 | ø        | 0,77 | <0,0005 |
|                    |               |                                |                                                                             | 26 | 15,75    | 0,67 | <0,001  |
|                    |               |                                |                                                                             | 24 | 10,90    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                                |                                                                             | 22 | 22,00    |      |         |
|                    |               |                                |                                                                             | 25 | ø        |      |         |
|                    |               |                                |                                                                             | 25 | ø        |      |         |
|                    |               |                                |                                                                             | 25 | ø        |      |         |



Tabelle 7

- Blatt 2 -

Mann: n.b.

Frau: n.b.

Serum: 955

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox.                | Extrapositivitäten                                                                    | N                          | $\chi^2$                              | r                                    | p                                             |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| E643               | 2, -/13, W15    | 5xW17xW15xW5<br>5<br>W17<br>W15<br>W5 | 12, 9/12, W10<br>9, W32/7, W21                                                        | 27<br>14<br>13<br>14<br>15 | 19,32<br>7,46<br>6,24<br>7,46<br>8,57 | 0,86<br>0,76<br>0,42<br>0,72<br>0,75 | <0,0005<br><0,01<br><0,025<br><0,01<br><0,005 |
| E645               | W32, -/W27, W17 | W5+W15+W17<br>W5<br>W15<br>W17        | 9, W32?/7, W21                                                                        | 28<br>21<br>22<br>20       | 17,08<br>7,13<br>16,62<br>12,59       | 0,78<br>0,57<br>0,86<br>0,65         | <0,0005<br><0,01<br><0,0005<br><0,0005        |
| E961               | 2, 9/12, W10    | ? pos 6, neg. 23                      | 1, 11/W5, 8<br>3, 9/7, W15<br>2, 9/W5, W21<br>1, 9/W5, -<br>9, -/5, 12<br>2, 10/7, 12 | 29                         |                                       |                                      |                                               |

Tabelle 8

Mann: 2,-/W27, W17

Frau: n. b

Serum: 960

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S960               |               | 5                      |                    | 36 | 36,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E450               | 2, 11/5, 7    | 5 + W27                |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |               | 5                      |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |               | W27                    |                    | 23 | 23,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E451               | 1, 11/W5, 8   | negativ                |                    | 25 | Ø        |      |          |
| E642               | 2, 3/W27, W15 | 5                      |                    | 27 | 17,28    | 0,80 | < 0,0005 |
| E945               | 3, 9/W5, W15  | 5                      |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |



Tabelle 10

| Serum: 999         | Frau: 3,11/7,12 | Mann: 3,-/7,-          |                    |    |          |        |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----|----------|--------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | p      |
| S999               |                 | 8                      |                    | 25 | 25,00    | 1,00   |
| E454               | 2,-/8,W15       | 8                      |                    | 25 | 11,97    | 0,69   |
|                    |                 |                        |                    |    |          | 0,0005 |
|                    |                 |                        |                    |    |          | 0,001  |

Tabelle 11

| Serum: 1008        | Frau: 9,- /W5,-         | Mann: 1,2/8,W10          |                                                                                 |                            |                                        |                                      |                                                                            |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle                   | Spezifität<br>Zytotox.   | Extrapositivitäten                                                              | N                          | $\chi^2$                               | r                                    | p                                                                          |
| S1008              |                         | 7x8 + W14<br>W14         | 2,- /W17?, 13<br>1,3/W5, W22<br>2,10/5,12                                       | 40<br>23                   | 20,41<br>5,00                          | 0,71<br>0,45                         | $\leq 0,0005$<br>$\leq 0,05$                                               |
| E548               |                         | 7                        | 1,9/W17, W18                                                                    | 32                         | 16,76                                  | 0,72                                 | $\leq 0,0005$                                                              |
| E549               | 1,11/W5,8<br>3,- /W14,- | 8<br>negativ<br>negativ  | W28, W32/W5,12<br>1, $\leq$ W19/8, W15<br>1, $\leq$ W19/8, W15<br>3,10/7, W18   | 27<br>25<br>30             | 7,91<br>$\emptyset$<br>$\emptyset$     | 0,53                                 | $\leq 0,005$                                                               |
| E550               | W32,- /7, 13            | 7+8+W14<br>7<br>8<br>W14 |                                                                                 | 28<br>23<br>22<br>19       | 15,55<br>16,40<br>16,62<br>8,97        | 0,74<br>0,79<br>0,86<br>0,68         | $\leq 0,0005$<br>$\leq 0,0005$<br>$\leq 0,0005$<br>$\leq 0,005$            |
| E714               | 2,10/W18, W14           | 7+8+W14<br>7<br>8<br>W14 | 2,10/5,12<br>2,9/W5, W21<br>2,- /W17?, 12                                       | 35<br>27<br>25<br>22       | 21,13<br>16,06<br>13,28<br>3,81        | 0,79<br>0,76<br>0,72<br>0,41         | $\leq 0,0005$<br>$\leq 0,0005$<br>$\leq 0,0005$<br>$\leq 0,1$              |
| E715               | 2,9/12, W10             | 7+8+W14<br>7<br>8<br>W14 | 1,9/W17, W18<br>2,10/5,12<br>2,9/W27, W17?<br>2,9/W5, W21<br>2,- /W17?, 12      | 32<br>22<br>18<br>20<br>25 | 13,55<br>12,24<br>7,53<br>0,42<br>7,66 | 0,65<br>0,67<br>0,56<br>0,14<br>0,55 | $\leq 0,0005$<br>$\leq 0,0005$<br>$\leq 0,01$<br>$\leq 0,5$<br>$\leq 0,01$ |
| E584               | 1,2/8, W15              | 7+8<br>7<br>8            | 1,9/W17, W18<br>W28, W32? /W5,12<br>1,9/W5, W21<br>2,9/W27, W17?<br>2,9/W5, W21 | 15<br>21                   | 5,29<br>3,69                           | 0,50<br>0,41                         | $\leq 0,025$<br>$\leq 0,10$                                                |

Tabelle 12

Mann: 3, W29/W10, -

Frau: 1, -/7, 8

Serum: 1012

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S1012              |               | W27x13x12xW17          | W29, 9/7, W21      | 43 | 19,61    | 0,67 | < 0,0005 |
|                    |               | W27                    | 3, 10/7, W18       | 30 | 10,15    | 0,61 | < 0,005  |
|                    |               | W17                    | 2, 9/W5, W21       | 27 | 7,56     | 0,52 | < 0,01   |
|                    |               | 13                     | 1, 9/W5, -         | 28 | 6,22     | 0,46 | < 0,025  |
|                    |               | 12                     |                    | 28 | 6,22     | 0,46 | < 0,025  |
| E250               | 1, -/13, W10  | 13xW27xW17x5x12        | 9, W29/7, W21      | 26 | 11,79    | 0,67 | < 0,001  |
|                    |               | W27                    | 1, 9/W5, -         | 15 | 1,60     | 0,31 | < 0,3    |
|                    |               | W17                    | 3, 10/7, W18       | 16 | 2,93     | 0,47 | < 0,1    |
|                    |               | 12                     | 2, 9/W5, W21       | 17 | 4,09     | 0,48 | < 0,05   |
|                    |               | 13                     |                    | 18 | 5,14     | 0,52 | < 0,025  |
| E360               | 2, 11/5, 7    | 5                      |                    | 16 | 2,93     | 0,42 | < 0,1    |
|                    |               | W27x13x5xW17x12        | W29, 9/7, W21      | 30 | 17,50    | 0,76 | < 0,0005 |
|                    |               | W27                    | 1, 9/W5, -         | 18 | 4,50     | 0,50 | < 0,05   |
|                    |               | 13                     | 3, 10/7, W18       | 20 | 7,50     | 0,77 | < 0,01   |
|                    |               | 5                      | 2, 9/W5, W21       | 18 | 4,50     | 0,50 | < 0,05   |
| E562               | 2, 9/W27, W17 | W17                    |                    | 18 | 4,50     | 0,50 | < 0,05   |
|                    |               | 12                     |                    | 19 | 6,10     | 0,56 | < 0,025  |
|                    |               | W27x5xW17x13x12        | W29, 9/7, W21      | 27 | 10,17    | 0,61 | < 0,005  |
|                    |               | (xW10)                 |                    |    |          |      |          |
|                    |               | W27                    | 1, 9/W5, -         | 16 | 2,87     | 0,41 | < 0,1    |
|                    |               | 5                      | 3, 10/7, W18       | 14 | 1,07     | 0,26 | < 0,3    |
|                    |               | W17                    | 2, 9/W5, W21       | 15 | 2,01     | 0,36 | < 0,2    |
|                    |               | 13                     |                    | 16 | 2,87     | 0,41 | < 0,1    |
|                    |               | 12                     |                    | 11 | 11,00    | 1,00 | < 0,01   |
|                    |               | W10                    |                    | 8  | 8,00     | 1,00 | < 0,005  |

Tabelle 12

- Blatt 2 -  
Mann: 3, W29/W10, -

Frau: 1, -/7, 8

Serum: 1012

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle                              | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r     | p         |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----|----------|-------|-----------|
| E638               | 2, -/13, W15                       | 13xW17xW17x5x12        | 3, 9/7, W15        | 25 | 10, 04   | 0, 63 | < 0, 005  |
|                    |                                    | 13                     | 1, 9/W5, -         | 14 | 2, 86    | 0, 40 | < 0, 1    |
|                    |                                    | W27                    | 2, -/W15, -        | 14 | 2, 86    | 0, 40 | < 0, 1    |
|                    |                                    | W17                    | 3, 10/7, W18       | 13 | 2, 02    | 0, 38 | < 0, 2    |
|                    |                                    | 5                      | 2, 9/W5, W21       | 13 | 2, 02    | 0, 48 | < 0, 2    |
| E948               | 3, 10/7, W18                       | 12                     |                    | 15 | 3, 63    | 0, 48 | < 0, 1    |
|                    |                                    | W27+5+12               | 1, 9/W5, -         | 30 | 11, 42   | 0, 61 | < 0, 001  |
|                    |                                    | W27                    | 2, -/W15, -        | 23 | 11, 30   | 0, 65 | < 0, 001  |
|                    |                                    | 5                      | 2, 9/W5, W21       | 23 | 11, 30   | 0, 65 | < 0, 001  |
|                    |                                    | 12                     |                    | 24 | 0, 68    | 0, 14 | < 0, 5    |
| A229<br>E229       | W32, -/W27, W17<br>W32, -/W27, W17 | negativ                | W29, 9/7, W21      | 30 | 13, 28   | 0, 66 | < 0, 0005 |
|                    |                                    | W27x5xW17x13x12        | 1, 9/7, W5         | 30 | 1, 66    | 0, 30 | < 0, 2    |
|                    |                                    | W27                    | 2, -/W15, -        | 18 | 1, 66    | 0, 30 | < 0, 2    |
|                    |                                    | 5                      | 3, 9/7, W15        | 19 | 3, 07    | 0, 40 | < 0, 1    |
|                    |                                    | W17                    | 3, 10/7, W18       | 21 | 5, 43    | 0, 50 | < 0, 025  |
| E249               | 1, 2/8, W15                        | 13                     | 2, 9/W5, W21       | 20 | 4, 31    | 0, 45 | < 0, 05   |
|                    |                                    | 12                     |                    | 25 | 11, 84   | 0, 68 | < 0, 001  |
|                    |                                    | W27x13xW17x12          |                    | 20 | 21, 00   | 1, 00 | < 0, 0005 |
|                    |                                    | W27                    |                    | 21 | 13, 26   | 0, 79 | < 0, 0005 |
|                    |                                    | 13                     |                    | 20 | 20, 00   | 1, 00 | < 0, 0005 |
|                    |                                    | W17                    |                    | 20 | 4, 21    | 0, 45 | < 0, 05   |
|                    |                                    | 12                     |                    | 20 |          |       |           |

Tabelle 13

Mann: 2,3/7,-

Frau: 2,-/W5,-

Serum: 1021

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1021              |               | 7 x W27                |                    | 41 | 41,00    | 1,00 | <0,0005 |
| A251               | 2,-/5,7       | negativ                |                    | 37 | 37,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E251               | 2,-/5,7       | 7 x W27                |                    | 32 | 32,00    | 1,00 | <0,0005 |
| A252               | W32,-/W27,W17 | 7                      | 2,-/8,W15          | 22 | 14,67    | 0,89 | <0,0005 |
| E252               | W32,-/W27,W17 | 7 x W27                |                    | 20 | 16,15    | 0,89 | <0,0005 |
| A253               | 2,3/W27,W15   | negativ                |                    | 14 | 2,43     | 0,41 | <0,2    |
| E253               | 2,3/W27,W15   | 7 x W27                |                    | 20 | 12,85    | 0,80 | <0,0005 |
| A254               | 1,2/8,W15     | 7 x W27                |                    | 19 | 21,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E254               | 1,2/8,W15     | negativ                |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | <0,0005 |
| A255               | 1,-/13,W10    | 7                      |                    | 19 | 19,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E255               | 1,-/13,W10    | 7 x W27                |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | <0,0005 |
| A552               | 2,-/13,W15    | 7 + ?                  |                    | 23 | 23,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E552               | 2,-/13,W15    | negativ                |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                    | 21 | 8,75     | 0,64 | <0,005  |
|                    |               |                        |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        | 1,9/W5,-           | 29 | 7,47     | 0,5  | <0,01   |
|                    |               |                        | 1,2/W5,-           | 27 |          |      |         |

Tabelle 13

- Blatt 2 -  
Mann: 2,3/7,-

Frau: 2,-/W5,-

Serum: 1021

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle     | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| A716               | 2,-/8,W15 | 7 x W27                |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |           | W27                    |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | <0,005  |
| E716               | 2,-/8,W15 | negativ                |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |           |                        |                    | 25 |          |      |         |

Tabelle 14

Serum: 1043      Frau: 2,-/7,-      Mann: 2,-/5,W17

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox.      | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1043              |              | 5xW17xW5x12x13x<br>W15xW21  |                    | 41 | 20,39    | 0,7  | <0,0005 |
|                    |              | 5                           |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W17                         |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W5                          |                    | 15 | 7,50     | 0,70 | <0,01   |
|                    |              | 12                          |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | 13                          |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W15                         |                    | 17 | 7,96     | 0,68 | <0,005  |
| E633               | 2,9/12,W10   | W21                         |                    | 13 | 13,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | 5xW17xW15x12x13x<br>W5xW21  | 3,10/7,W18         | 26 | 12,90    | 0,70 | <0,0005 |
|                    |              | 5                           |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
|                    |              | W17                         |                    | 8  | 4,80     | 0,77 | <0,05   |
|                    |              | W15                         |                    | 9  | 5,76     |      | <0,025  |
|                    |              | 12                          |                    | 9  | 5,76     |      | <0,025  |
|                    |              | 13                          |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
| E344               | 9,W32?/7,W21 | W5                          |                    | 7  | 1,21     | 0,41 | <0,3    |
|                    |              | W21                         |                    | 6  | 2,40     | 0,63 | <0,1    |
|                    |              | 5xW17xW15x12x13x<br>W15xW21 | 3,10/7,W18         | 23 | 16,38    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |              | 5                           |                    | 5  | 1,87     | 0,60 | <0,2    |
|                    |              | W17                         |                    | 6  | 3,00     | 0,70 | <0,1    |
|                    |              | W5                          |                    | 6  | 3,00     | 0,70 | <0,1    |
|                    |              | 12                          |                    | 6  | 3,00     | 0,70 | <0,1    |

Tabelle 14

- Blatt 2 -  
Mann: 2,-/5, W17

Serum: 1043

Frau: 2,-/7,-

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox.     | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| E344               |                 | 13<br>W15<br>W21           |                    | 6  | 3,00     | 0,70 | <0,1    |
| A344               | 9, W32? /7, W21 | W17xW21                    | 2,-/W15,-          | 10 | 6,42     | 0,80 | <0,025  |
|                    |                 |                            |                    | 5  | 1,87     | 0,60 | <0,2    |
|                    |                 |                            |                    | 21 | 17,25    | 0,88 | <0,0005 |
|                    |                 |                            |                    | 21 | 15,81    | 0,86 | <0,0005 |
| E347               | 2, 9/13, W17    | 5xW17xW5x12x13x<br>W15xW21 | 3, 10/7, W18       | 19 | 11,92    | 0,78 | <0,0001 |
|                    |                 |                            |                    | 23 | 16,38    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |                 | 5<br>W17                   |                    | 5  | 1,87     | 0,6  | <0,2    |
|                    |                 | W5                         |                    | 6  | 3,000    | 0,7  | <0,1    |
|                    |                 | 12                         |                    | 6  | 3,00     | 0,7  | <0,1    |
|                    |                 | 13                         |                    | 6  | 3,00     | 0,7  | <0,1    |
|                    |                 | W15                        |                    | 6  | 3,00     | 0,7  | <0,1    |
|                    |                 | W21                        |                    | 10 | 6,42     | 0,8  | <0,025  |
|                    |                 | 5xW17xW5x12x13x<br>W15xW21 | 3, 10/7, W18       | 5  | 1,87     | 0,6  | <0,2    |
| E230               | W32,-/W27, W17  |                            |                    | 24 | 18,24    | 0,87 | <0,0005 |
|                    |                 | 5<br>W17                   |                    | 6  | 2,40     | 0,63 | <0,2    |
|                    |                 | W5                         |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
|                    |                 | 12                         |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
|                    |                 | 13                         |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
|                    |                 | W15                        |                    | 7  | 3,73     | 0,72 | <0,1    |
|                    |                 | W21                        |                    | 11 | 4,41     | 0,63 | <0,05   |
|                    |                 |                            |                    | 6  | 2,40     | 0,63 | <0,2    |

Tabelle 14

- Blatt 3 -  
Mann: 2, -/5, W17

Serum: 1043

Frau: 2, -/7, -

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox.  | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| E232               | W28, -/W5, 12 | 5xW17xW15x13x<br>W21    | 3, 10/7, W18       | 23 | 6,10     | 0,53 | <0,025  |
| A486               | 1, 2/5, 8     | 5                       |                    | 14 | 6,46     | 0,67 | <0,025  |
|                    |               | W17                     |                    | 15 | 9,23     | 0,78 | <0,005  |
|                    |               | W15                     |                    | 16 | 3,20     | 0,44 | <0,1    |
|                    |               | 13                      |                    | 14 | 2,43     | 0,41 | <0,2    |
|                    |               | W21                     |                    | 14 | 6,46     | 0,67 | <0,025  |
| E486               | 1, 2/5, 8     | W17xW21                 |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W21                     |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | 5xW17x12x13xW15x<br>W21 | 3, 10/7, W18       | 22 | 10,80    | 0,7  | <0,005  |
|                    |               | 5                       | 2, -/8, W27        | 10 | 2,59     | 0,5  | <0,2    |
|                    |               | W17                     |                    | 11 | 4,27     | 0,61 | <0,05   |
|                    |               | 12                      |                    | 12 | 5,59     | 0,67 | <0,025  |
|                    |               | 13                      |                    | 12 | 5,59     | 0,67 | <0,025  |
|                    |               | W15                     |                    | 12 | 2,74     | 0,46 | <0,1    |
|                    |               | W21                     |                    | 10 | 3,93     | 0,65 | <0,05   |

Tabelle 15

Mann: 2,-/8, W10

Frau: 2,-/W5,-

Serum: 1044

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle                                                              | Spezifität<br>Zytotox.                                                                                                                                        | Extrapositivitäten             | N                                                                                                                                            | $\chi^2$                                                                                                                                                                                                                         | r                                                                                                                                                                                                                 | p                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1044               |                                                                    | W10+7+13<br>W10<br>7<br>13<br>negativ<br>W10+13+<br>W10<br>13<br>7<br>negativ<br>7xW10x13xW27<br>7<br>W10<br>13<br>W27<br>W10<br>13xW10x(?)<br>13<br>W10<br>7 |                                | 33<br>20<br>25<br>20<br>24<br>24<br>16<br>17<br>21<br>30<br>30<br>21<br>17<br>16<br>17<br>23<br>18<br>17<br>22<br>32<br>25<br>25<br>26<br>24 | 23,89<br>20,00<br>20,30<br>20,00<br>$\emptyset$<br>5,00<br>16,00<br>17,00<br>2,70<br>$\emptyset$<br>22,85<br>14,00<br>8,74<br>6,85<br>8,74<br>23,00<br>11,91<br>18,00<br>17,00<br>7,71<br>9,87<br>11,41<br>11,41<br>2,48<br>7,30 | 0,80<br>1,00<br>0,90<br>1,00<br>$\emptyset$<br>0,40<br>1,00<br>1,00<br>0,31<br>$\emptyset$<br>0,87<br>0,81<br>0,71<br>0,64<br>0,71<br>1,00<br>0,73<br>1,00<br>1,00<br>0,53<br>0,55<br>0,67<br>0,67<br>0,3<br>0,54 | <0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br>$\emptyset$<br><0,05<br><0,005<br><0,005<br><0,2<br>$\emptyset$<br><0,0005<br><0,0005<br><0,005<br><0,01<br><0,005<br><0,001<br><0,0005<br><0,0005<br><0,01<br><0,005<br><0,001<br><0,001<br><0,2<br><0,01 |
| A460<br>E460       | 2,9/12, W10<br>2,9/12, W10                                         |                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A624<br>E624       | 2,9/12, W10<br>2,9/12, W10<br>(1,2-fache Serum-<br>menge von E460) |                                                                                                                                                               | 1, < W19/8, W15<br>2,9/W5, W21 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A461<br>E461       | 2,-/13, W15<br>2,-/13, W15                                         |                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A361               | 3,9/7, W15                                                         | 13x12xW10x7<br>13<br>12<br>7<br>W10                                                                                                                           | 2,9/W27, W17?<br>2,9/W5, W21   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Serum: 1044      Frau: 2,-/W5,-      - Blatt 2 -      Mann: 2,-/8, W10      Tabelle 15

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| E361               | 3,9/7, W15 | 7xW10                  |                    | 31 | 31,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |            | 7                      |                    | 28 | 28,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |            | W10                    |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | < 0,0005 |

Tabelle 16

Mann: 3,-/5,7

Frau: 2,10/W10,-

Serum: 1054

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytoflox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1054              |               | 5xW17xW5                | 9, W32/7, W21      | 39 | 30,51    | 0,88 | <0,0005 |
|                    |               | 5                       |                    | 31 | 23,88    | 0,87 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     |                    | 30 | 21,66    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |               | W5                      |                    | 32 | 20,21    | 0,79 | <0,0005 |
| A341               | 2,9/13,-      | 5                       |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E341               | 2,9/13,-      | 5x13xW17                | 9, W32/7, W21      | 33 | 19,31    | 0,78 | <0,0005 |
|                    |               | 5                       | 2,9/7, W21         | 28 | 15,45    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |               | 13                      |                    | 27 | 12,42    | 0,67 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     |                    | 27 | 7,19     | 0,5  | <0,01   |
| A342               | 9, W32/7, W21 | 5                       |                    | 26 | 26,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E342               | 9, W32/7, W21 | 5xW17+?                 |                    | 33 | 18,28    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |               | 5                       | W32,-/7, 13        | 30 | 16,66    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     | 9, W32/7, W21      | 29 | 7,86     | 0,51 | <0,0005 |
| A343               | 2,10/5, 12    | negativ                 |                    | 32 | Ø        |      |         |
| E343               | 2,10/5, 12    | 5xW5xW17                |                    | 32 | 19,36    | 0,77 | <0,0005 |
|                    |               | 5                       |                    | 27 | 14,85    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |               | W5                      |                    | 27 | 14,85    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     |                    | 26 | 6,85     | 0,51 | <0,01   |
| A462               | W28,3/4SL,7   | negativ                 |                    | 24 | Ø        |      |         |
| E462               | W28,3/4SL,7   | 5xW5xW17                |                    | 24 | 16,00    | 0,81 | <0,0005 |
|                    |               | 5                       |                    | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | W5                      |                    | 21 | 15,81    | 0,86 | <0,0005 |
|                    |               | W17                     |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |

Tabelle 16

- Blatt 2 -

Mann: 3,-/5,7

Frau: 2,10/W10,-

Serum: 1054

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| A485               | W32,-/7,13 | 5                      |                    | 23 | 23,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E485               | W32,-/7,13 | 13x5+?                 |                    | 27 | 13,47    | 0,70 | <0,0005 |
|                    |            | 13                     | 2,9/W5,W21         | 25 | 9,64     | 0,61 | <0,005  |
|                    |            | 5                      |                    | 24 | 11,47    | 0,68 | <0,001  |
| A647               | 1,3/W5,-   | 5                      |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E647               | 1,3/W5,-   | 5xW5                   |                    | 27 | 17,58    | 0,80 | <0,0005 |
|                    |            | 5                      | 9,W32/7,W21        | 24 | 17,14    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |            | W5                     |                    | 24 | 11,76    | 0,70 | <0,001  |

Tabelle 17

Mann: 2,9/W14,-

Frau: 2,11/7,-

Serum: 1055

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten                                                  | N              | $\chi^2$              | r                    | p                           |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| S1055              |               | 5xW14x?<br>5<br>W14    | W32,-/W27,W17<br>3,10/-,7<br>1,2/8,W15<br>1,1/W19/8,W15<br>1,10/7,8 | 30<br>27<br>27 | 12,95<br>8,01<br>8,01 | 0,65<br>0,53<br>0,53 | <0,0005<br><0,005<br><0,005 |
| E233               | W32,-/W27,W17 | negativ                |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E234               | 1,1/W19/8,W15 | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E281               | 3,-/W14,-     | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E282               | 2,10/W14,W18  | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E283               | 2,3/5,12      | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E284               | 1,3/W5,-      | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E285               | 2,-/8,W15     | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E349               | 2,3/5,12      | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E468               | 3,-/W14,-     | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E484               | 3,-/7,8       | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E603               | W28,-/W27,W14 | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E717               | 3,11/7,W15    | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E718               | 3,11/5,7      | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |
| E719               | 2,10/W15,-    | unklar                 |                                                                     |                |                       |                      |                             |

Tabelle 18

Mann: 2,9/7,-

Frau: 9,-/5,12

Serum: 1060

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1060              |              | 7xW10xW27<br>7         | 1,9/W17, W18       | 36 | 32,07    | 0,94 | <0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 32 | 27,54    | 0,92 | <0,0005 |
|                    |              | W27                    |                    | 26 | 18,65    | 0,76 | <0,0005 |
| A235               | 2,3/W27, W15 | 7xW10<br>7             |                    | 25 | 9,64     | 0,62 | <0,005  |
|                    |              | W10                    |                    | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W27                    |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E235               | 2,3/W27, W15 | 7xW10+W27+W15+?<br>7   | 1,9/W17, W18       | 10 | 10,00    | 1,00 | <0,005  |
|                    |              | W10                    |                    | 25 | 14,00    | 0,74 | <0,0005 |
|                    |              | W27                    |                    | 19 | 15,35    | 0,89 | <0,0005 |
|                    |              | W15                    |                    | 14 | 9,54     | 0,82 | <0,005  |
| A256               | 2,-/5,7      | 7xW10+W15+W27<br>7     |                    | 12 | 1,92     | 0,40 | <0,2    |
| E256               | 2,-/5,7      | W10                    |                    | 13 | 4,17     | 0,56 | <0,05   |
|                    |              | W15                    |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W27                    |                    | 23 | 13,21    | 0,74 | <0,0005 |
| A257               | 2,9/W27, W17 | 7xW10+W15+W27<br>7     | 1,9/W17, W18       | 18 | 14,31    | 0,88 | <0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 13 | 7,87     | 0,77 | <0,005  |
|                    |              | W15                    |                    | 13 | 4,17     | 0,56 | <0,05   |
|                    |              | W27                    |                    | 12 | 1,92     | 0,40 | <0,2    |
|                    |              | 7xW10                  |                    | 17 | 17,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E257               | 2,9/W27, W17 | 7xW10+W27+?<br>7       | 1,9/W17, W18       | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 10 | 10,00    | 1,00 | <0,005  |
|                    |              | W27                    |                    | 24 | 17,62    | 0,83 | <0,0005 |
|                    |              | 7xW10+W27+?<br>7       |                    | 22 | 18,15    | 0,9  | <0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 16 | 9,90     | 0,78 | <0,005  |
|                    |              | W27                    |                    | 15 | 2,68     | 0,41 | <0,2    |

Tabelle 18

- Blatt 2 -  
Mann: 2,9/7,-

| Serum:             | 1060          | Frau:                   | 9,-/5,12           | - Blatt 2 - | Mann: 2,9/7,- |              |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytoflox. | Extrapositivitäten | N           | $\chi^2$      | r p          |
| A356               | 1, W19/8, W15 | 7                       |                    | 25          | 25,00         | 1,00 <0,0005 |
| E356               | 1, W19/8, W15 | 7xW10                   |                    | 25          | 25,00         | 1,00 <0,0005 |
| A357               | 3,-/5, W27    | 7xW10                   |                    | 23          | 23,00         | 1,00 <0,0005 |
|                    |               | 7                       |                    | 22          | 22,00         | 1,00 <0,0005 |
|                    |               | W10                     |                    | 16          | 16,00         | 1,00 <0,0005 |
| E357               | 3,-/5, W27    | 7xW10                   |                    | 24          | 13,33         | 0,74 <0,0005 |
|                    |               | 7                       |                    | 22          | 13,03         | 0,76 <0,0005 |
|                    |               | W10                     |                    | 20          | 12,09         | 0,79 <0,001  |
| A358               | 2,9/12, W10   | 7                       |                    | 25          | 25,00         | 1,00 <0,0005 |
| E358               | 2,9/12, W10   | 7+W10+W27               |                    | 28          | 24,15         | 0,92 <0,0005 |
|                    |               | 7                       |                    | 22          | 22,00         | 1,00 <0,0005 |
|                    |               | W10                     |                    | 19          | 19,00         | 1,00 <0,0005 |
|                    |               | W27                     |                    | 12          | 7,87          | 0,77 <0,005  |

Tabelle 19

Mann: 2,5,7

Frau: 9,W32/7, SL

Serum: 1065

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox.            | Extrapositivitäten       | N                         | $\chi^2$                         | r                            | p                                        |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| S1065              |               | 5xW5+W18,2<br>5<br>W5<br>W18<br>2 |                          | 40<br>15<br>17<br>15      | 25,87<br>15,00<br>17,00<br>15,00 | 0,77<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | <0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005 |
| A286               | 2,10/W14, W18 | 5xW5                              |                          | 23<br>37<br>31,29<br>32   | 16,21<br>31,29<br>32,00          | 0,83<br>0,91<br>1,00         | <0,0005<br><0,0005<br><0,0005            |
| E286               | 2,10/W14, W18 | 5+W5+W18,2<br>5<br>W5<br>W18<br>2 |                          | 35<br>43<br>29<br>33      | 28,19<br>6,98<br>29,00<br>4,64   | 0,89<br>0,40<br>1,00<br>0,37 | <0,0005<br><0,01<br><0,0005<br><0,05     |
| A287               | 2,-/8, W15    | 5xW5+W18<br>5<br>W5<br>W18        |                          | 29<br>30<br>38<br>29      | 18,61<br>3,33<br>38,00<br>29,00  | 0,80<br>0,33<br>1,00<br>1,00 | <0,0005<br><0,10<br><0,0005<br><0,0005   |
| E287               | 2,-/8, W15    | 2                                 |                          | 32                        | 32,00                            | 1,00                         | <0,0005                                  |
| A288               | 2,3/5, 12     | negativ                           |                          | 31                        | 31,00                            | 1,00                         | <0,0005                                  |
| E288               | 2,3/5, 12     | 5xW5+W18<br>5<br>W5<br>W18        | 1,2/8, W15<br>2,-/8, W15 | 37<br>Ø<br>38<br>27<br>31 | 3,81<br>29,63<br>17,28<br>25,50  | 0,32<br>0,88<br>0,80<br>0,34 | <0,1<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005    |
|                    |               |                                   |                          | 29                        | 16,67                            | 0,75                         | <0,0005                                  |

Tabelle 19

- Blatt 2 -  
9, W32/7, SL Mann: 2, 5, 7

Frau:

Serum: 1065

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle    | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| A289               | 1,3/W5,- | 5                      |                    | 28 | 17,95    | 0,8  | <0,0005 |
| E289               | 1,3/W5,- | W5+5+W18               | 2,-/8, W15         | 35 | 16,03    | 0,67 | <0,0005 |
|                    |          | 5                      |                    | 29 | 18,61    | 0,8  | <0,0005 |
|                    |          | W5                     |                    | 31 | 14,04    | 0,67 | <0,0005 |
|                    |          | W18                    |                    | 28 | 7,86     | 0,51 | <0,01   |

Tabelle 20

| Serum: 1079        | Frau: 1,2/7,8      |                                              | Mann: 1,2/W5,-                 |    |          |      |         |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----|----------|------|---------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle              | Spezifität<br>Zyftotox.                      | Extrapositivitäten             | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
| S1079              |                    | 5xW17xETxW19,9<br>5<br>W17<br>ET<br>W18<br>9 | 2,-/W15,-                      | 42 | 34,38    | 0,90 | <0,0005 |
| E236               | W28, W32? / W5, 12 | negativ                                      |                                | 25 | 17,89    | 0,84 | <0,0005 |
| E447               | 2, 11/W17,-        | 5xW17xETxW18,9<br>5<br>W17<br>ET<br>W18<br>9 | 2,-/W15,-<br>W32,-/7, 13       | 25 | 17,89    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 24 | 15,27    | 0,79 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 24 | 15,27    | 0,79 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 29 | 19,85    | 0,82 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 25 |          |      |         |
|                    |                    |                                              |                                | 24 | 13,59    | 0,75 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 15 | 4,28     | 0,52 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 15 | 4,28     | 0,52 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 15 | 4,28     | 0,52 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 15 | 1,29     | 0,28 | <0,3    |
|                    |                    |                                              |                                | 19 | 11,63    | 0,78 | <0,001  |
| E636               | 2,9/12, W10        | 5xW17xETxW18,9<br>5<br>W17<br>ET<br>W18<br>9 | 2, W32? / 13, W15<br>2,-/W15,- | 29 | 18,29    | 0,79 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 17 | 4,95     | 0,53 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 7,87     | 0,65 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 7,87     | 0,65 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 7,87     | 0,65 | <0,05   |
|                    |                    |                                              |                                | 21 | 9,45     | 0,67 | <0,05   |
| E637               | 2,10/5, 12         | 5xW17xETxW18,9<br>5<br>W17<br>ET<br>W18<br>9 |                                | 33 | 33,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 18 | 18,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                    |                                              |                                | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |

Tabelle 20

- Blatt 2 -  
Mann: 1,2/W5,-

Frau: 1,2/7,8

Serum: 1079

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p          |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|------------|
| E950               | 2,-/W15,-     | 5xW17                  |                    | 29 | 29,00    | 1,00 | $< 0,0005$ |
|                    |               | 5                      |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | $< 0,0005$ |
|                    |               | W17                    |                    | 26 | 26,00    | 1,00 | $< 0,0005$ |
| E951               | 2,11/W17?, SL | 5xW17xETxW18           | W32,-/7,13         | 30 | 18,75    | 0,79 | $< 0,0005$ |
|                    |               | 5                      |                    | 22 | 8,29     | 0,6  | $< 0,05$   |
|                    |               | W17                    |                    | 24 | 18,24    | 0,87 | $< 0,0005$ |
|                    |               | ET                     |                    | 22 | 13,93    | 0,72 | $< 0,0005$ |
|                    |               | W18                    |                    | 21 | 4,20     | 0,44 | $< 0,05$   |

Tabelle 21

| Serum: 1106        |            | Frau: 1,-/8,-                                                                                                                                                                  | Mann: 1/8, W15                                                                                                                               | Tabelle                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox.                                                                                                                                                         | Extrapositivitäten                                                                                                                           | N                                                                                                                        | $\chi^2$                                                                                                                                                                | r                                                                                                                                                             | p                                                                                                                                                                                         |
| 1106               |            | W15+W17+12+13+<br>W5+W10<br>W15<br>W17<br>13<br>12<br>W5<br>W10<br>W15+W17+12+13+<br>W5+5(+ W10)<br>W15<br>W17<br>12<br>13<br>W5<br>5<br>W10<br>W15+W10<br>W10<br>W15<br>W15+? | 3,-/W14,-<br>3,10/7, W18<br>1,3/8,-<br><br>W32?, 9/7, W21<br>3,10/7, W18<br><br><br>W28,-/W5,12<br>3,11/W10,-<br>1,11/W5,8<br>W32?, 9/7, W21 | 39<br>18<br>15<br>12<br>22<br>15<br>11<br>31<br>17<br>11<br>12<br>10<br>12<br>11<br>10<br>27<br>21<br>25<br><br>27<br>27 | 24,74<br>9,16<br>6,56<br>3,36<br>12,32<br>6,56<br>1,92<br>12,34<br>10,57<br>4,27<br>5,59<br>2,59<br>1,18<br>4,27<br>2,59<br>27,00<br>21,00<br>25,00<br><br>8,88<br>3,43 | 0,79<br>0,70<br>0,65<br>0,52<br>0,74<br>0,69<br>0,41<br>0,63<br>0,78<br>0,61<br>0,67<br>0,5<br>0,3<br>0,61<br>0,5<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br><br>0,57<br>0,35 | <0,0005<br><0,005<br><0,025<br><0,1<br><0,0005<br><0,025<br><0,2<br><0,0005<br><0,005<br><0,025<br><0,2<br><0,3<br><0,05<br><0,2<br><0,0005<br><0,0005<br><0,0005<br><br><0,005<br><0,010 |
| E348               | 2,9/13,-   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| E350               | 3,-/W14,-  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| E351               | 1,3/W5,8   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| E352               | W32,-/7,13 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 21

- Blatt 2 -  
Mann: 1/8, W15

Frau: 1,-/8,-

Serum: 1106

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle          | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| E352               |                | W15                    | 3,-/8,7            | 17 | 6,49     | 0,61 | <0,025  |
|                    |                | W17                    | 3,10/7, W18        | 14 | 4,20     | 0,54 | <0,05   |
|                    |                | 13                     | 3,11/W10,-         | 13 | 3,34     | 0,5  | <0,1    |
|                    |                | 5                      |                    | 12 | 0,06     | 0,24 | <0,8    |
|                    |                | 12                     |                    | 11 | 0,24     | 0,14 | <0,7    |
| E354               | 2,3/5,12       | W15+W17+W10            |                    | 27 | 27,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W15                    |                    | 19 | 19,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W17                    |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W10                    |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W15+13+?               |                    | 24 | 15,84    | 0,81 | <0,0005 |
| E355               | 3,10/W5,7      | W15                    | 3,11/W10,-         | 23 | 14,52    | 0,79 | <0,0005 |
|                    |                | 13                     |                    | 18 | 8,47     | 0,68 | <0,005  |
|                    |                | W15+W17+13+12+         |                    | 22 | 14,72    | 0,81 | <0,0005 |
|                    |                | (W10)+?                |                    |    |          |      |         |
|                    |                | W15                    |                    | 15 | 10,31    | 0,82 | <0,005  |
| E333               | W32,-/W27, W17 | W17                    |                    | 14 | 8,55     | 0,78 | <0,005  |
|                    |                | 13                     |                    | 14 | 8,55     | 0,78 | <0,005  |
|                    |                | 12                     |                    | 13 | 2,17     | 0,40 | <0,2    |
|                    |                | W10                    |                    | 13 | 5,95     | 0,67 | <0,05   |
|                    |                | W15+W17+W5+13          |                    | 23 | 19,32    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |                | (+W10)                 |                    |    |          |      |         |
|                    |                | W15                    |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W17                    |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |                | W5                     |                    | 13 | 7,87     | 0,77 | <0,005  |
|                    |                | W10                    |                    | 12 | 12,00    | 1,00 | <0,001  |
| E334               | 1,2/8, W15     |                        |                    |    |          |      |         |
|                    |                |                        |                    |    |          |      |         |

Tabelle 21

- Blatt 3 -

Mann: 1/8, W15

Frau: 1,-/8,-

Serum: 1106

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| E334               |              | 13                     |                    | 13 | 13,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E335               | 1,9/W17, W18 | W15+W17+W5+(W10)       |                    | 22 | 15,23    | 0,83 | <0,0005 |
|                    |              | W15                    |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W17                    |                    | 16 | 16,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |              | W5                     |                    | 14 | 3,94     | 0,53 | <0,05   |
|                    |              | W10                    |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E336               | 2,-/W17, W14 | W15+W17+W10            | 1,3/8,-            | 24 | 20,00    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |              | W15                    |                    | 19 | 13,35    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |              | W17                    |                    | 19 | 13,35    | 0,84 | <0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 18 | 11,25    | 0,78 | <0,001  |

Tabelle 22

Mann: (10), -/W18, -

Frau: 2, -/W14

Serum: 1113

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N | $\chi^2$ | r | p |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---|----------|---|---|
| S1113              | 2, -/8, W15     | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E487               | W28, W18/W5, 12 | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E488               | 2, 9/13, -      | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E489               | 9, W32/7, W21   | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E346               | 2, 11/5, 7      | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E720               | 2, 9/5, 12      | unklar                 |                    |   |          |   |   |
| E721               |                 |                        |                    |   |          |   |   |

Tabelle 23

Mann: 3, 10/7(5, 12, W17)?

Frau: 2, -/W27

Serum: 1126

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten                                                 | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|------|---------|
| S1126              |               | 5x12+?                 | 2, 9/W5, W21<br>9, W32/7, W21                                      | 38 | 16,06    | 0,64 | <0,0005 |
| A345               | 9, W32/7, W21 | 5                      |                                                                    | 33 | 19,68    | 0,74 | <0,0005 |
| E345               | 9, W32/7, W21 | 5                      |                                                                    | 32 | 1,39     | 0,20 | <0,3    |
| A369               | 3, 10/W5, 7   | 5x12                   |                                                                    | 12 | 29,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               |                        |                                                                    | 24 | 2,18     | 0,30 | <0,2    |
|                    |               |                        |                                                                    | 26 | 1,74     | 0,22 | <0,2    |
| E369               | 3, 10/W5, 7   | 5x?                    | W26, W32? /W5, 12<br>2, 9/12, W10<br>2, -/8, W27<br>2, 9/W27, W17? | 23 | 0,56     | 0,14 | <0,5    |
|                    |               |                        |                                                                    | 24 | 11,41    | 0,67 | <0,001  |
|                    |               |                        |                                                                    | 26 | 11,91    | 0,67 | <0,001  |
| E576               | 9, W32/7, W21 | 5xW5x12+13+W15         |                                                                    | 28 | 5,98     | 0,45 | <0,025  |
|                    |               | 5                      |                                                                    | 23 | 9,00     | 0,60 | <0,0005 |
|                    |               | W5                     |                                                                    | 22 | 6,17     | 0,50 | <0,025  |
|                    |               | 13                     |                                                                    | 22 | 3,84     | 0,40 | <0,05   |
|                    |               | 12                     |                                                                    | 23 | 13,63    | 0,73 | <0,0005 |
|                    |               | W15                    |                                                                    | 23 | 9,00     | 0,60 | <0,005  |
| E722               | 2, 11/5, 7    | 5                      | 2, 9/W5, W21                                                       | 23 | 16,38    | 0,84 | <0,0005 |

Tabelle 24

| Serum: 1148        | Frau: n.b. | Mann: n.b.             | Tabelle 24         |    |          |      |          |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
| S1148              | 1,2/8, W15 | 8                      |                    | 30 | 30,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E466               |            | 8                      |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |

Tabelle 25

| Serum:             | 1168          | Frau:                  | 9,-/W17,-                                                     | Mann:          | 2,-/ W15             |                      |                         |  |  |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten                                            | N              | $\chi^2$             | r                    | p                       |  |  |
| S1168              |               | 12xW15+?               | -,-/7,13<br>W32,-/W17,W27<br>2,10/-,-<br>1,3/W5,W22<br>2,9/W5 | 39<br>21<br>24 | 5,62<br>7,63<br>2,41 | 0,42<br>0,53<br>0,28 | <0,025<br><0,01<br><0,2 |  |  |
| E467               | 9,W29/7,W21   | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E490               | W28,-/W5,12   | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E538               | W32,-/W17,W27 | negativ                |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E539               | 2,-/8,W15     | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E540               | 3,9/7,W15     | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E541               | W32,-/7,13    | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |
| E723               | 2,11/5,7      | unklar                 |                                                               |                |                      |                      |                         |  |  |

Tabelle 26

Mann: 2,-/5,12

Frau: W32,-/5,-

Serum: 1176

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p          |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|------------|
| S1176              |            | 2                      |                    | 39 | 35,15    | 0,94 | $< 0,0005$ |
| E652               | 1,2/8,W15  | 2                      |                    | 26 | 26,00    | 1,00 | $< 0,0005$ |
| E762               | 2,-/8,W15  | 2                      |                    | 29 | 25,19    | 0,93 | $< 0,0005$ |
| E764               | 2,W29/5,12 | 2                      |                    | 28 | 21,00    | 0,86 | $< 0,0005$ |



Tabelle 27

Mann: 1,2/8, W10

- Blatt 2 -  
Frau: W32,-/5,-

Serum: 1196

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten       | N  | $\chi^2$ | r     | p       |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----|----------|-------|---------|
| E368               | 1, 2/W19/8, W15 | 2xW28; 7xW10+V15       | 1,9/W5,-<br>1,3/W5, W22  | 34 | 21,51    | 0,79  | <0,0005 |
|                    |                 | 2                      |                          | 19 | 0,01     | 0,068 | <0,95   |
|                    |                 | W28                    |                          | 18 | 5,29     | 0,53  | <0,025  |
|                    |                 | 7                      |                          | 23 | 15,22    | 0,81  | <0,0005 |
|                    |                 | W10                    |                          | 19 | 8,38     | 0,66  | <0,005  |
| E542               | 1,9/W17, W18    | W15                    | 2xW28; 7xW10xW15x<br>W18 | 18 | 5,71     | 0,55  | <0,025  |
|                    |                 | 2xW28; 7xW10xW15x      |                          | 27 | 19,40    | 0,84  | <0,0005 |
|                    |                 | W18                    |                          | 14 | 2,94     | 0,45  | <0,1    |
|                    |                 | 2                      |                          | 8  | 4,44     | 0,66  | <0,05   |
|                    |                 | W28                    |                          | 12 | 2,74     | 0,46  | <0,1    |
|                    |                 | 7                      |                          | 11 | 6,51     | 0,76  | <0,025  |
|                    |                 | W10                    |                          | 10 | 1,40     | 0,37  | <0,3    |
|                    |                 | W15                    |                          | 13 | 9,24     | 0,84  | <0,005  |
|                    |                 | W18                    |                          |    |          |       |         |
|                    |                 |                        |                          |    |          |       |         |

Tabelle 28

| Serum: 1206        | Frau: 10,-/W10, W22 | Mann: -, -/7, W5       |                                                         |    |          |      |          |
|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle               | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten                                      | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
| S1206              |                     | W5                     | 2,10/W14, W18<br>W32,9/7, W21<br>2,9/12, W10<br>1,3/8,- | 41 | 20,24    | 0,70 | < 0,0005 |
| A653               | 1,3/W5,-            | negativ                |                                                         | 26 | Ø        |      |          |
| E653               | 1,3/W5,-            | negativ                |                                                         | 26 | Ø        |      |          |
| A531               | 3,10/W5,7           | negativ                |                                                         | 37 | Ø        |      |          |
| E531               | 3,10/W5,7           | negativ                |                                                         | 37 | Ø        |      |          |
| E724               | W28,-/W5,12         | negativ                |                                                         | 23 | Ø        |      |          |
| E958               | 2,9/12, W10         | negativ                |                                                         | 29 | Ø        |      |          |

Tabelle 29

Mann: 2,-/7, W10

Frau: 1, 10/8, W17

Serum: 1214

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S1214              |              | 2xW28; 7+W10<br>2      |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W28                    |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | 7                      |                    | 7  | 7,00     | 1,00 | < 0,01   |
|                    |              | W10                    |                    | 12 | 12,00    | 1,00 | < 0,001  |
|                    |              |                        |                    | 7  | 7,00     | 1,00 | < 0,01   |
| A464               | 2, 3/7, W18  | 2xW28                  |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | 2                      |                    | 23 | 23,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W28                    |                    | 12 | 12,00    | 1,00 | < 0,001  |
| E464               | 2, 3/7, W18  | 2+W28; 7+W10           |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | 2                      |                    | 13 | 13,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W28                    |                    | 6  | 6,00     | 1,00 | < 0,025  |
|                    |              | 7                      |                    | 11 | 11,00    | 1,00 | < 0,001  |
|                    |              | W10                    |                    | 6  | 7,00     | 1,00 | < 0,01   |
| A465               | 3, 11/W10, - | 2xW28                  |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | 2                      |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W28                    |                    | 10 | 10,00    | 1,00 | < 0,005  |
| E465               | 3, 11/W10, - | 2; 7 + W10             |                    | 24 | 19,42    | 0,89 | < 0,0005 |
|                    |              | 2                      |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W10                    |                    | 8  | 8,00     | 1,00 | < 0,005  |
|                    |              | 7                      |                    | 12 | 8,57     | 0,84 | < 0,005  |

Tabelle 30

Mann: 1,2/8, W15

Frau: 2,-/-, 12

1215

Serum:

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1215              |               |                        |                    | 33 | 33,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E760               | 2,10/W14, W18 | W18                    |                    | 29 | 29,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E761               | 2,3/7, W18    | W18                    |                    | 29 | 29,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E1070              | 3, W32/W5, 12 | negativ                |                    |    |          |      |         |
| E1071              | 2, 10/5, 12   | negativ                |                    |    |          |      |         |
| E1072              | 2,3/W27, W15  | negativ                |                    |    |          |      |         |
| E1073              | 2,9/W27, W17  | negativ                |                    |    |          |      |         |

Tabelle 31

Serum: 1218      Frau: 3,11/7,-      Mann: 11,-/12,-

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$    | r    | p       |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----|-------------|------|---------|
| S1218              |               | 12+13+W27              |                    | 26 | 19,10       | 0,85 | <0,0005 |
|                    |               | 12                     |                    | 17 | 17,00       | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | 13                     |                    | 16 | 11,07       | 0,83 | <0,001  |
|                    |               | W27                    |                    | 16 | 11,07       | 0,83 | <0,001  |
| A532               | 2,-/5,12      | negativ                |                    | 20 | $\emptyset$ |      |         |
| E532               | 2,-/5,12      | 12                     |                    | 20 | 20,00       | 1,00 | <0,0005 |
| A533               | W32,-/7,13    | negativ                |                    | 20 | $\emptyset$ |      |         |
| E533               | W32,-/7,13    | 12+13                  |                    | 20 | 20,00       | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | 12                     |                    | 18 | 18,00       | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | 13                     |                    | 17 | 17,00       | 1,00 | <0,0005 |
| A534               | W29,-/W5,12   | negativ                |                    | 20 | $\emptyset$ |      |         |
| E534               | W28,-/W5,12   | 12                     |                    | 20 | 12,59       | 0,79 | <0,0005 |
| A535               | W32,-/W27,W17 | 12                     |                    | 20 | 20,00       | 1,00 | <0,0005 |
| E535               | W32,-/W27,W17 | 12+13+W27              |                    | 20 | 12,38       | 0,78 | <0,0005 |
|                    |               | 12                     |                    | 17 | 17,00       | 1,00 | <0,0005 |
|                    |               | 13                     |                    | 15 | 6,96        | 0,68 | <0,01   |
|                    |               | W27                    |                    | 15 | 6,96        | 0,68 | <0,01   |
| E654               | 2,3/W27,W15   | 12+W27                 |                    | 24 | 18,94       | 0,88 | <0,0005 |
|                    |               | 12                     |                    | 23 | 17,43       | 0,86 | <0,0005 |
|                    |               | W27                    |                    | 20 | 9,47        | 0,68 | <0,005  |

Tabelle 32

Serum: 1220

Frau: 2,3/12,W15

Mann: 2,10/5

labelle sz

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytoflox. | Extrapositivitäten                                                                                                | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|---------|
| S1220              |            | 5+?                     | 2,10/5,12<br>2,10/W14,W18<br>1, W19/8,W15<br>2,W32/13,W15<br>3,-/W14,-<br>2,9/12,W10<br>2,9/W27,W17<br>3,11/7,W15 | 31 | 9,64     | 0,55 | <0,005  |
| E478               | 2,-/5,12   | 5                       |                                                                                                                   | 23 | 23,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E479               | 1,11/W5,8  | 5                       |                                                                                                                   | 22 | 22,00    | 1,00 | <0,0005 |
| E634               | 2,9/12,W10 | negativ                 |                                                                                                                   | 22 | Ø        | Ø    |         |
| E725               | 2,-/13,W15 | negativ                 |                                                                                                                   | 36 | Ø        | Ø    |         |
| E726               | 3,-/W14,-  | negativ                 |                                                                                                                   | 36 | Ø        | Ø    |         |
| E727               | 2,10/7,12  | negativ                 |                                                                                                                   | 36 | Ø        | Ø    |         |

Tabelle 33

Mann: 2,(10)/7,13

Frau: 1,2/8, SL

Serum: 1223

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p         |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|-----------|
| S1223              |              | 7                      |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | $<0,0005$ |
| E754               | 2,11/5,7     | 7                      |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | $<0,0005$ |
| E755               | 3,9/7, W15   | 7 + ?                  | 2,9/12, W10        | 20 | 16,15    | 0,89 | $<0,0005$ |
| E756               | 2,3/7, W18   | 7 + ?                  | 2,9/12, W10        | 20 | 13,16    | 0,81 | $<0,0005$ |
| E757               | W32, -/7, 13 | 7                      | 2,9/W27, W17       | 20 | 20,00    | 1,00 | $<0,0005$ |

Tabelle 34

Serum: 1225      Frau: 1,3/7,-      Mann: 2,-/12,W17

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox.                                                                                      | Extrapositivitäten | N                                                     | $\chi^2$                                                                            | r                                                                            | p                                                                                                                |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1225              |              | 2xW28;W17<br>2<br>W17<br>W28<br>2 x W28<br>2<br>W28<br>2 x W28<br>2<br>W28<br>negativ<br>negativ<br>negativ |                    | 29<br>25<br>11<br>9<br>26<br>25<br>9<br>26<br>25<br>9 | 29,00<br>25,00<br>11,00<br>9,00<br>26,00<br>25,00<br>9,00<br>26,00<br>25,00<br>9,00 | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | < 0,0005<br>< 0,0005<br>< 0,001<br>< 0,005<br>< 0,0005<br>< 0,0005<br>< 0,005<br>< 0,0005<br>< 0,0005<br>< 0,005 |
| E758               | 2,-/3,W15    |                                                                                                             |                    |                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                  |
| E759               | 2,10/W14,W18 |                                                                                                             |                    |                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                  |
| E1074              | 3,11/7,W15   |                                                                                                             |                    |                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                  |
| E1075              | 3,W32/W5,12  |                                                                                                             |                    |                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                  |
| E1076              | 3,10/7,W18   |                                                                                                             |                    |                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                  |

Serum: 1240

Frau: 3,-/7,5

Mann: 3,9/7,W5

Tabelle 35

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$    | r    | p          |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----|-------------|------|------------|
| S1240              |                 |                        |                    | 26 | 26,00       | 1,00 | $< 0,0005$ |
| A646               | 3,9/7, W15      | 9<br>negativ           |                    | 26 | $\emptyset$ |      |            |
| E646               | 3,9/7, W15      | 9<br>negativ           |                    | 26 | 26,00       | 1,00 | $< 0,0005$ |
| E1079              | 2,3/W27, W15    | negativ                |                    |    |             |      |            |
| E1080              | 1,2/8, W15      | negativ                |                    |    |             |      |            |
| E1081              | W28, 10/7, < SL | negativ                |                    |    |             |      |            |
| E1082              | 2,11/5,7        | negativ                |                    |    |             |      |            |

Tabelle 36

Mann: 3,-/5,7

Frau: 9,-/-,-

Serum: 1247

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle      | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p       |
|--------------------|------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|---------|
| S1247<br>E471      | 3,-/W14,-  | 3                      | 2, W32? /13, W15   | 31 | 31,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |            | 3 x 11                 |                    | 24 | 20,16    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |            | 3                      |                    | 22 | 17,96    | 0,90 | <0,0005 |
| E959               | 2,11/<SL,- | 11                     |                    | 16 | 7,46     | 0,67 | <0,01   |
|                    |            | 3 x 11                 |                    | 27 | 22,44    | 0,91 | <0,0005 |
|                    |            | 3                      |                    | 23 | 23,00    | 1,00 | <0,0005 |
|                    |            | 11                     |                    | 20 | 12,59    | 0,79 | <0,0005 |

Tabelle 37

Serum: 1248      Frau: 1, W28/5, -      Mann: 2, -/W15, -

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle            | Spezifität<br>Zytotox.                  | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S1248              |                  |                                         |                    | 29 |          |      |          |
| E765               | 1, 4, W19/8, W15 | polyspezifisch<br>W15xW22<br>W15<br>W22 | 2, 3/W18, 7        | 29 | 23,15    | 0,89 | < 0,0005 |
|                    |                  | negativ                                 |                    | 24 | 24,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E766               | W32, -/W27, W17  | W15+W22                                 |                    | 27 | 27,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E767               | 2, 11/W17, -     | W22<br>W15<br>W22?                      | 2, 3/W18, 7        | 29 | ø        |      |          |
|                    |                  | W15                                     |                    | 29 | 16,67    | 0,75 | < 0,0005 |
| E768               | 3, 9/7, W15      |                                         |                    | 25 | 25,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E769               | 2, 3/W27, W15    |                                         |                    | 26 | 14,60    | 0,79 | < 0,0005 |
|                    |                  |                                         | 2, 3/W18, 7        | 29 | 29,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |                  |                                         |                    | 27 | 13,47    | 0,70 | < 0,0005 |

Tabelle 38

| Serum: 1251        |             | Frau: 2,-/W5, W18      |                    | Mann: 2,-/7,8 |          | Tabelle |          |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|---------|----------|
| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle       | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N             | $\chi^2$ | r       | p        |
| S1251              |             | 7xW10                  | 2,-/8, W15         | 23            | 19,32    | 0,91    | < 0,0005 |
|                    |             | 7                      |                    | 20            | 17,32    | 0,90    | < 0,0005 |
|                    |             | W10                    |                    | 13            | 8,55     | 0,78    | < 0,005  |
| E469               | 3,10/W5,7   | 7 x W10                |                    | 23            | 23,00    | 1,00    | < 0,0005 |
|                    |             | 7                      |                    | 22            | 22,00    | 1,00    | < 0,0005 |
|                    |             | W10                    |                    | 14            | 14,00    | 1,00    | < 0,0005 |
| A470               | 2,9/12, W10 | negativ                |                    |               |          |         |          |
| E470               | 2,9/12, W10 | 7 x W10                |                    | 24            | 24,00    | 1,00    | < 0,0005 |
|                    |             | 7                      |                    | 23            | 23,00    | 1,00    | < 0,0005 |
|                    |             | W10                    |                    | 15            | 15,00    | 1,00    | < 0,0005 |

Tabelle 39

Mann: 3,-/W27,(W18)

Frau: W32,11/W5,-

Serum: 1254

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle         | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten    | N  | $\chi^2$    | r    | p        |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----|-------------|------|----------|
| S1254              |               | W27 + 7                |                       | 23 | 11,24       | 0,69 | < 0,001  |
| A482               | 2,-/13,W15    | W27 + 7                |                       | 17 | 17,00       | 1,00 | < 0,0005 |
| E482               | 2,-/13,W15    | W27 + 7                |                       | 21 | 9,24        | 0,66 | < 0,005  |
| A483               | W28,3/7, < SL | negativ                |                       | 22 | 8,55        | 0,62 | < 0,005  |
| E483               | W28,3/7, < SL | W27 + ?                |                       | 17 | 17,00       | 1,00 | < 0,0005 |
| A481               | 2,9/W27,-     | negativ                |                       | 20 | 6,66        | 0,57 | < 0,01   |
| E481               | 2,9/W27,-     | W27                    |                       | 23 | $\emptyset$ | 0,50 | < 0,025  |
|                    |               |                        |                       | 23 | 5,85        | 0,50 | < 0,025  |
|                    |               |                        |                       | 20 | 20,00       | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |               |                        |                       | 21 | 3,85        | 0,42 | < 0,05   |
|                    |               |                        | 2,11/5,7<br>2,3/W18,7 | 23 | 10,40       | 0,67 | < 0,005  |
|                    |               |                        |                       | 23 | $\emptyset$ | 1,00 | < 0,005  |
|                    |               |                        |                       | 23 | 23,00       | 1,00 | < 0,005  |

Tabelle 40

Mann: (W28),(3)/W5,12

Frau: 3,9/W10,-

Serum: 1256

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle       | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S1256              |             | 5 + W5; 2              |                    | 39 | 34,94    | 0,94 | < 0,0005 |
|                    |             | 2                      |                    | 29 | 25,26    | 0,93 | < 0,0005 |
|                    |             | 5                      |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |             | W5                     |                    | 20 | 20,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| A472               | 1,2/5,8     | W5                     |                    | 23 | 12,42    | 0,73 | < 0,0005 |
| E472               | 1,2/5,8     | 5 + W5                 |                    | 24 | 14,40    | 0,77 | < 0,0005 |
|                    |             | 5                      |                    | 19 | 19,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E473               | 1,2/W5,-    | W5                     |                    | 23 | 12,42    | 0,73 | < 0,0005 |
|                    |             | 5 x W5                 |                    | 22 | 18,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E728               | 2,9/W27,W17 | 5                      |                    | 17 | 17,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E960               | 2,10/7,12   | W5                     |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |             | negativ                |                    | 23 | Ø        |      |          |
|                    |             | negativ                |                    | 20 | Ø        |      |          |

Tabelle 41

Mann: 2,3/W5,-

Frau: 3,-/7, W5

Serum: 1272

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle           | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p          |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|------------|
| S1272              |                 | 2                      | 9, W32/7, W21      | 34 | 30,06    | 0,94 | $< 0,0005$ |
| A649               |                 | negativ                |                    | 27 | $\phi$   |      |            |
| E649               | 2, 9/12, W10    | 2 x W28                | 9, W32/7, W21      | 27 | 22,95    | 0,92 | $< 0,0005$ |
|                    |                 | 2                      |                    | 26 | 22,15    | 0,92 | $< 0,0005$ |
|                    |                 | W28                    |                    | 12 | 5,45     | 0,67 | $< 0,025$  |
| A650               | W28,-/W5, 12    | 2                      |                    | 28 | 28,00    | 1,00 | $< 0,0005$ |
| E650               | W28,-/W5, 12    | 2 + W28 + ?            | 9, W32/7, W21      | 28 | 24,15    | 0,92 | $< 0,0005$ |
|                    |                 | 2                      |                    | 27 | 23,20    | 0,92 | $< 0,0005$ |
|                    |                 | W28                    |                    | 13 | 5,95     | 0,64 | $< 0,025$  |
| A655               | 1, < W19/8, W15 | 2 x ?                  | 9, W32/7, W21      | 28 | 24,23    | 0,93 | $< 0,0005$ |
| E655               | 1, < W19/8, W15 | negativ                |                    | 28 |          |      |            |
| E729               | 9, W32/7, W21   | negativ                |                    | 17 |          |      |            |

Tabelle 42

Mann: 2,-/(12),-

Frau: 3,-/7, W14

Serum: 1282

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle        | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p        |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|----------|
| S1282              |              | 9; W15+W17+W5+5        |                    | 39 | 28,26    | 0,95 | < 0,0005 |
|                    |              | 9                      |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W15                    |                    | 22 | 22,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W17                    |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W5                     |                    | 18 | 12,60    | 0,83 | < 0,0005 |
|                    |              | 5                      |                    | 17 | 4,95     | 0,54 | < 0,05   |
|                    |              | negativ                |                    | 27 | $\phi$   |      |          |
| A543               | 1,9/W17, W18 | 9; 5xW5, W17, W15      |                    | 27 | 27,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E543               | 1,9/W17, W18 | 9                      |                    | 14 | 14,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W15                    |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| A544               |              | W15                    |                    | 15 | 15,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| E544               | 2,3/5, 12    | 5xW17, W15 + W5; 9     | 1,3/W5, -          | 27 | 23,10    | 0,92 | < 0,0005 |
|                    |              | 9                      |                    | 17 | 12,98    | 0,87 | < 0,0005 |
|                    |              | 5                      |                    | 13 | 7,87     | 0,77 | < 0,005  |
|                    |              | W17                    |                    | 12 | 1,00     | 0,29 | < 0,04   |
|                    |              | W15                    |                    | 17 | 13,24    | 0,87 | < 0,0005 |
|                    |              | 9                      |                    | 27 | 27,00    | 1,00 | < 0,0005 |
| A545               | 3,11/7, W15  | W17+W5+W15             |                    | 27 | 23,20    | 0,92 | < 0,0005 |
| E545               |              | W15                    |                    | 21 | 21,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W17                    |                    | 18 | 18,00    | 1,00 | < 0,0005 |
|                    |              | W5                     |                    | 18 | 11,25    | 0,79 | < 0,001  |

Tabelle 43

Mann: (W28), 1/5, 8

Frau: W28, 9/7, W17

Serum: 1291

| Serum-Nr.<br>Eluat | Zelle               | Spezifität<br>Zytotox. | Extrapositivitäten | N  | $\chi^2$ | r    | p         |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----|----------|------|-----------|
| S1291              |                     | 1                      |                    | 29 | 29,00    | 1,00 | $<0,0005$ |
| E480               | 1,2/W5,-            | 1                      |                    | 26 | 26,00    | 1,00 | $<0,0005$ |
| E689               | 1,2/8, W15          | 1                      |                    | 29 | 29,00    | 1,00 | $<0,0005$ |
| E1083              | 2,9/12, $\angle$ SL | 1                      |                    |    |          |      |           |
| E1084              | 2,10/7, 12          | 1                      |                    |    |          |      |           |
| E1085              | 3,11/7, W15         | 1                      |                    |    |          |      |           |

## E. DISKUSSION

### I. Diskussion der Ergebnisse

#### 1. Kreuzreaktionen

Die auffallende Tendenz der Antigene des HL-A-Systems, untereinander kreuzreagieren, soll im folgenden diskutiert werden.

Man weiß nicht genau, welcher Natur die Genprodukte sind; schienen die Berichte von DAVIES 1968 und 1969 (182, 183) die Annahme einer Beschaffenheit aus Lipoproteinen oder Glykoproteinen zu stützen, so machen die letzten Studien von NATHENSON 1971 (171) und REISFELD und KAHAN 1970 (172) eher wahrscheinlich, daß es sich um Polypeptide von 300 bis 500 Aminosäuren handelt. Die Verteilung elektrischer Ladungen und die Raumstruktur bei Proteinen sind von den Verhältnissen in den Trägermolekülen, in diesem Fall von den benachbarten Zellwandmolekülen, stark beeinflußt. Anti-Protein-Antikörper müssen deshalb für variable Raumstrukturen und Ladungsverhältnisse der Antigene eingerichtet sein. Es wäre denkbar, daß auf diese Weise Kreuzreaktionen aufgrund von Antigen-Ähnlichkeiten begünstigt werden. Außerdem reagieren Anti-Protein-Antikörper im allgemeinen avider als z.B. Polysaccharid/Antipolysaccharid-Systeme, die durch niedrige Affinität und damit auch Avidität gekennzeichnet sind (186).

Definiert man Spezifität einer Antikörper-Population als das Vermögen, zwischen Antigenen ähnlicher Struktur zu unterscheiden mittels der Reaktionsstärke, so mag die unterschiedliche Affinität in Polypeptid- und Polysaccharid-Systemen dafür verantwortlich sein, daß jede Antikörper-Protein-Antikörperpopulation unspezifischer reagieren wird als eine Antikörper-Population gegen Zucker.

Die Kreuzreaktionen können auch Ausdruck der starken Antigenität des HL-A-Systems sein, welche sicherlich gegeben ist. Benutzt man zur Anschauung die Angaben von SALOMON und SCHWARZ (63): daß 32 % aller Frauen mit Anti-HL-A-Antikörpern und 6 % aller Frauen ohne HL-A-Antikörper antierythrozytäre Antikörper haben, so ergibt sich, daß allen HL-A-Antikörperhäufigkeiten bei schwangeren Frauen, die gleich oder größer 8,5 %<sup>+)</sup> sind, eine Frequenz von Antikörpern gegen erythrozytäre Systeme zuzuordnen ist, die kleiner als 8,5 ist, d.h. also, daß die Antigenität des HL-A-Systems in jedem Falle größer ist als die des erythrozytären.

<sup>+)</sup> Die Literaturangaben über HL-A-spezifische Zytotoxine, ohne Beachtung der Schwangerschaftszahl, streuen zwischen 8,6 % (76) und 46,7 % (77), zit. nach 76), so daß man wohl einen Prozentsatz über 8,5 als gegeben annehmen darf.

Sicherlich ist auch der komplexe Aufbau der antigenen Strukturen verantwortlich für die Kreuzreaktionen der Antikörper. Es fragt sich, welcher Art diese Komplexität ist. Nach welchem Code sind serologische Ergebnisse zu interpretieren? HIRSCHFELD (120) hat vorgeschlagen: entweder werden die Antikörper als einfach, die Antigene als komplex gedeutet, oder die Antigene als einfach, die Antikörper als komplex begriffen. Er nennt die erste Möglichkeit simple-complex-code, die zweite complex-simple-code. Ein einfacher Antikörper richtet sich dabei gegen eine Antigen determinante, ein komplexer gegen Antigene mit mehreren Determinanten. Ein einfaches Antigen setzt sich aus einer Sorte von Determinanten zusammen, ein komplexes aus mehreren. Eine Antigen determinante wird folgendermaßen definiert: "The simplest serological element which either alone or in combination with elements of the same or different kinds constitutes an antigen and reacts with antibodies." Keines dieser Modelle befriedigt: Code 1 führt zu komplexen Genotypen, die schwer mit den genetischen Analysen in Einklang gebracht werden können. Code 2 ermöglicht es nicht, die zum Teil widersprüchlichen serologischen Verhaltensweisen der Antigene zu erklären.

Ein anderes Modell haben BATCHELOR und SANDERSON (78) entworfen. Es besagt, daß die zur Zeit bekannten HL-A-Antigene multifaktoriell sind und die Antigene gemeinsame Untereinheiten haben. Es soll erläuternd gesagt werden, daß im Prinzip jede fremde Struktur von einer gewissen Mindestgröße ab und unter entsprechenden Kontaktbedingungen als Antigen wirken kann. Für Peptid-Antigen-Determinanten gilt als durchschnittliche Größe 8, höchstens 12 Aminosäuren. KABAT (184) hat für das Bindungsfeld eines Antikörpers 5 bis 7 Aminosäuren angegeben. Das Molekulargewicht der HL-A-Antigene nach Papainbehandlung, 35.000 - 50.000 (116, 117, 118), ist dagegen ein Vielfaches des Molekulargewichts von 8 - 12 Aminosäuren, was sich mit einem multifaktoriellen Modell vereinbart. Die Antigenuntereinheiten sind nicht als separate Einheiten anzusehen, sondern als Strukturen, die erst durch Bindung eines Antikörpers gegen die restliche Oberfläche eines antigenen Moleküls sich abgrenzen, wobei um diese Bindung sowohl Antikörper gegen nebeneinanderliegende Abschnitte als auch gegen sich überlappende konkurrieren. Ein Anti-HL-A-Antiserum enthält auf diese Weise ziemlich heterogene Antikörper-Populationen. Demnach hängt die Kreuzreaktion eines Serums von der Anzahl der gemeinsamen Untereinheiten von Immunogen und kreuzreagierendem Antigen ab. Nicht zuletzt kann die spezielle Beschaffenheit der Antigenstruktur Kreuzreaktionen aufgrund der Determinanten-Ähnlichkeit, im Gegensatz zu Determinanten-Identität zulassen oder auch nicht.

So erklärt sich, daß ein Antikörper mit dem Immunogen stark reagiert, mit heterologen Antigenen schwach. Damit übereinstimmend findet man die Tendenz, daß das Immunogen auf einer

Plättchenzelle das breiteste Antikörperspektrum absorbiert. Das heißt, daß es die meisten Antikörper-Populationen aus dem Antiserum herausholt und/oder mit den einzelnen Antikörpern am stärksten reagiert. Die heterologen Antigene neigen dazu, ohne erkennbares System, meist weniger, selten mehr Spezifitäten in unterschiedlichen Kombinationen zu absorbieren.

Diesem komplexen Sachverhalt wird die multifaktorielle Theorie von BATCHELOR und SANDERSON am ehesten gerecht. Sie gibt auch eine gute Erklärung dafür, warum die Antikörper der Schwangerenserum während der Schwangerschaft spezifischer reagieren als nach der Entbindung: die Faktoren, aus denen sich ein Antigen zusammensetzt, unterscheiden sich u.a. durch ihre Immunogenität. Der Organismus bildet immer neue Antikörper aus, zuletzt gegen den schwächsten Immunogenfaktor. Bei einem monofaktoriellen Modell kann man sich die Verbreiterung nur so erklären, daß mit andauernder Stimulierung eine Aviditätszunahme Hand in Hand geht mit einer Spezifitätsabnahme (186). Eine dritte Erklärung im Sinne eines SIN-Phänomens würde auf beide Modelle passen: von FRANCIS (187) und FAZEKAS (188) beschrieben, bedeutet es, daß eine Restimulierung eines vorimmunisierten Empfängers durch ein kreuzreagierendes Antigen, in diesem Falle durch mikrobielle Stimuli vor und nach der Entbindung (189) in einer stärkeren Immunantwort gegenüber dem Originalantigen sich äußert.

## 2. Monospezifische Seren

Nach BATCHELOR und SANDERSON erscheint es sinnvoll, die Existenz eines monospezifischen Antiserums gegen HL-A-Antigene im Sinne WALFORDS (4) zu bezweifeln. Als "operationally monospecific" sieht WALFORD ein Serum an, "if the cells of all of 29 positively reacting thirty party persons completely absorb out the antibody, when back-tested against the original immunizing donor." Diese Bedingung reicht aber streng genommen nicht hin, weil

1. wie WALFORD es selbst sagt, es nicht auszuschließen ist, daß in dem Serum zwei oder mehr Antikörper vorliegen, die sich gegen Antigene richten, die in über 90 % der Fälle assoziiert sind.
2. Im Serum ein kreuzreagierender Antikörper sein kann und
3. das Serum nach jeder von 29 Absorptionen leer erscheinen kann, wenn ein nur synergistisch wirkender Antikörper, der in ihm enthalten ist, nicht absorbiert wurde und allein zytotoxisch nicht in Erscheinung tritt. Die neun Seren dieser Arbeit, die im Originalserum und den Eluaten monospezifisch waren, können noch nicht einmal als "operational monospecific" bezeichnet werden. Es ist denkbar, daß weitere Eluate Bi- und Oligospezifität gezeigt hätten.

### 3. RNEP-Phänomen

Für das RNEP-Phänomen (Reaction negative, Elution positive) – Erstbericht 1965 von CEPPELLINI (79) – gibt es nach BIAS et al. (176) und YUNIS et al. (177) mehrere Erklärungsmöglichkeiten:

1. Genetisches Phänomen im Sinne einer Mutation, die die Antigensynthese vermindert oder die Synthese eines spezifischen Inhibitors der Antigen-Antikörper-Reaktion hemmt (176).
2. Sialinsäure Mukopolysaccharide, die die antigenen Determinanten bedecken.
3. Inhibierende Serumfaktoren.
4. Interferenz mit anderen HL-A-Antigenen.
5. Zytotoxische Reaktion abhängig von einer Minimalavidität des Antikörpers.
6. Eine Art von physiologischer Variante.
7. Mangel an Antigen determinanten auf der Zelloberfläche.

Die Dichte der HL-A-Antigene ist abhängig vom Organ (178), vom Genotypus (180), bei Retikulozyten vom Reifungsstadium (5) und bei Tumorzellen vom Zellstadium (179)<sup>†</sup>. Es ist merkwürdig, daß die RNEP-Phänomen-Häufigkeit nicht in etwa der zytotoxischen Reaktionsstärke der betroffenen Antigene proportional ist. Zum Beispiel reagiert HL-A 8 meistens sehr schwach zytotoxisch, soll aber nach WALFORD (4) nie oder selten CYNAP-Phänomene haben. Die vorliegenden Ergebnisse sind damit zu vereinbaren. Bei HL-A 9 (Serum 1291) sind RNEP-Phänomene auch sehr selten (4).

## II. Diskussion der Methode

### 1. Wahl der Methode

Es gilt dafür das in Abschnitt "Methoden zur Leukozytengruppierung" gesagte als Grundlage.

Die Wahl des LZTT stellt hinsichtlich der Reproduzierbarkeit und Sensitivität einen Kompromiß zwischen MKBR und Leukozytenagglutination dar; eine für die Untersuchung von Kreuzreaktionen hinreichend hohe Sensitivität mußte mit etwas geringerer Reproduzierbarkeit erkauft werden.

Die Säure-Eluattechnik hat sich als besonders geeignet für Untersuchungen an Kreuzreaktionen erwiesen, weil die Konzentration des Antikörpers und damit die Antikörperbreite variabel sind. Außerdem ist von Vorteil, daß zytotoxische Anti-ABO-

<sup>†</sup>) vgl. den TL-Antigenverlust bei Mäuselymphozyten nach Thymusaustritt (5) und bei Plättchen die große HL-A-Antigendichte nach längerer Lagerung (115).

Antikörper, die im Original eine neue Antikörper-Spezifität vortäuschen können, nicht säureeluiert werden (190). Die Absorbate und Eluate wurden an Thrombozyten ausgeführt, weil diese viel besser als Lymphozyten über längere Zeit zu lagern sind.

## 2. Fehlerquellen

### 2.1. materialbedingte

- a) Die Typisierungsseren waren nicht auf Anti-A, -B und Rhesus-Antikörper geprüft. Liegen zwei dieser drei Antikörper in einem Serum vor, so wirken sie auf AB Rh positive Lymphozyten zytotoxisch (83).
- b) Typisierungsseren aus fremden Labors waren nicht an der Bevölkerung im Gießener Raum standardisiert.
- c) Die Zellspender waren nicht geprüft auf Linksverschiebung: Granulozyten, Myelozyten und unreife Zellen werden leicht von Kaninchenserum unspezifisch getötet (88, 1). Die Zerfallsprodukte wirken außerdem antikomplementär (86).
- d) Die Serenspenden waren nicht auf leichte Urämie (88) und Rheumafaktoren (89 zit. nach 75) untersucht (erhöhte Antikomplementarität).
- e) 86 % der Kaninchenserum enthalten lymphozytotoxische Antikörper, von denen manche noch bei 56° C 30 Min. (191) lang stabil sind. Kaninchenserum enthalten auch unterschiedliche Konzentrationen von Komplementantikörpern, was die unterschiedlichen Resultate beim LZTT teilweise erklärt (131).

### 2.2. Methodisch bedingt

#### 1. bei der Inaktivierung

Das auf Seite 17 beschriebene Inaktivierungsverfahren verringert nicht die natürliche Antikomplementarität der Seren. Eine zu diesem Zweck ausgearbeitete Methode ist von NYMAND et al. beschrieben (84).

#### 2. beim Lymphozytotoxizitätstest

- a) Es gibt zytotoxische spezifische Nicht-HL-A-Antikörper mit einem Temperaturoptimum von 22° C, z.B. Anti-HL-B-Antikörper (85), Anti-Le<sup>a</sup>-Antikörper (16). Außerdem wurden beschrieben Anti-A<sub>1</sub>, -Le(a-b+)-Antikörper (153) und Anti-A<sub>1</sub> (190). Da Anti-HL-A-Antikörper ein Temperaturoptimum von 22 - 37° C je nach Inkubationszeit haben (86, 87 zit. nach 4), wäre zu überlegen, ob man bei der NIH-Technik nicht doch bei 37° C, dafür kürzer, inkubieren sollte, so wie es die Einstufentechnik vorschreibt, dort allerdings zu dem Zweck, das knapp bemessene Komplement zu aktivieren.

- b) Bei einem ungeklärten polyspezifischen Serum mögen Kälte-Autolymphozytotoxine ( $150^{\circ}\text{C}$ , 19S), die nach vielen Schwangerschaften, Transplantationen, infektiöser Mononucleose, Röteln, Masern, rheumatischen Herzkrankheiten, Hashimoto disease, Grave's disease, rheumatischer Arthritis, systemischem Lupus erythematoses und perniziöser Anämie (85, 133) auftreten, mitgespeilt haben.
- c) Durch Absorption wären nicht-komplement-fixierende Anti-HL-A-Antikörper auszuschließen gewesen
- d) Schließlich ist an lymphozytenspezifische Lymphozytotoxine zu denken (190).
- e) Die natürliche Antikomplementarität der Seren wird bei der NIH-Methode nicht ausgeschaltet. Ein Waschvorgang zwischen Seren-Zell-Inkubation und Komplement-Zugabe wäre nützlich.

### 3. Kritik der statistischen Auswertung

Die Aussagekraft des  $\chi^2$ -Wertes wird durch mehrere Faktoren beeinträchtigt:

1. Durch eine gewisse Beliebigkeit, mit der bestimmt wird, welche Vermutung für die Spezifität getestet wird. Der Fall wäre denkbar, daß die wirklich zutreffende Interpretation nicht geprüft wird, weil die auswertende Person nicht daran gedacht hat. Für diese Art von visueller Auswertung spricht aber, wie MUTOLSKY et al. sagen, die "iterative" Natur des Problems selbst: Es werden Antigene durch Antikörper und Antikörper durch Antigene erklärt. An diesen Feedback-Prozeß muß sich die Methode zur statistischen Auswertung angleichen.
2. Er basiert erstens auf serologischen Resultaten, die durch technische Unzulänglichkeiten beeinflusst wurden, welche quantitativ nicht erfaßt sind und zweitens der Qualität der getesteten Reagentien.
3. Der geringe Umfang des Testzell-Panels erlaubt keine stringente Interpretation der Ergebnisse. Nach SELWOOD (194) sind sogar alle Panel unter mehreren tausend Zellen unrepräsentativ. Am schlimmsten wirken sich kleine Panel bei Seren mit niedriger Reaktionsfrequenz aus. In ihrem Aufsatz "The Values of the Correlation Coefficient of Antigens Controlled by Allelic Genes in the Population at Equilibrium" (198) zeigen DÉMANT et al., daß ein signifikanter  $\chi^2$ -Wert nicht erreicht werden kann, selbst bei genügend vielen Testzellen, wenn die Frequenz von allelen Genen, die zwei Antigene bestimmen, sehr hoch oder sehr niedrig ist.

4. Durch die ungeheuer komplexe Situation im HL-A-System. Man bedenke, daß selbst ein relativ gut definiertes Antigen im Vergleich mit anderen, HL-A 2, in Absorptionsstudien als außerordentlich heterogen entdeckt wurde (197). KISSMEYER-NIELSEN und KJERBYE (195) halten sogar einen  $\chi^2$ -Wert für wenig interessant, sofern nicht völlige Identität besteht. Sie halten für vielmehr relevant, auf welche besondere Spezifität Extrapositivitäten zurückzuführen sind.

Dies scheint denjenigen recht zu geben, die einen Computereinsatz deshalb fordern, weil Wissenschaft in dem Maße, wie sie exakter wird, mathematischer sein muß (146). Man sollte aber auch die Grenzen der Computeranalysen bedenken: Faktorenanalyse mit Computern hat den Nachteil, daß dabei redundante und serologisch bedeutungslose neue Faktoren postuliert werden.

## F. ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden 400 Seren von unausgewählten Schwangeren auf antilymphozytäre Antikörper untersucht und die Kreuzreaktionen dieser Antikörper dargestellt. Als Untersuchungsmethoden dienten der Mikrolymphozytotoxizitätstest nach NIH, modifiziert nach MAYR und die Absorptions- und Elutionsmethode nach SHULMAN, modifiziert nach HEINRICH und MUELLER-ECKHARDT.

Insgesamt fanden sich 57 positive Seren, von denen 43 absorbiert und eluiert wurden. Davon konnten 39 in ihrer Spezifität abgeklärt werden. Fünf Seren enthielten Antikörper gegen Antigene des ersten Locus, 27 gegen Antigene des zweiten Locus und neun gegen Antigene beider Loci.

Die Seren zeigten mannigfaltige Kreuzreaktionen: Antikörper gegen Antigene des 1. Locus traten in fünf verschiedenen Kombinationen auf, Antikörper gegen den 2. Locus sogar in 41 Kombinationen. Für jedes Antigen wurde die Beteiligung der übrigen Antigene an seinen Kreuzreaktionen prozentual ausgedrückt und die Beziehungen zwischen den Antikörperspezifitäten und dem Antigenmuster des immunisierten Organismus dargestellt. Eine Quantifizierung der Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Antigenen wurde versucht.

## G. LITERATURVERZEICHNIS

1. KISSMEYER-NIELSEN, K., E. THORSBY:  
Human Transplantation Antigens. aus: Transplantation Reviews 4, Munksgaard, Kopenhagen (1970)
2. DAUSSET, J., F.T. RAPAPORT, L. LEGRAND,  
J. COLOMBANI, A. MARCELLI-BARGE:  
Skin allograft survival in 238 human subjects. Role of specific relationship at the four gene sites of the first and second HL-A loci. aus: Histocompatibility testing (1970) 381-398, Munksgaard, Kopenhagen 1970
3. FELLOUS, M., J. DAUSSET:  
Prabable Haploid Expression of HL-A Antigens on Human Spermatozoon. Nature 225 (1970) 191-193
4. WALFORD, R.L.:  
The isoantigenic systems of human leukocytes. Medical and biological significance. Series Haematol. II (1969) 2
5. ANDERSON (Hrsgb.):  
Reticulozytes and transplantation antigens. Biology and Surgery of Tissue Transplantation, 57-58
6. MAYR, W.R.:  
HL-A-System der Transplantationsantigene. Immunpathologie und Transplantation, Hrsgb. G. Seifert, Stuttgart (1970)
7. METCHNIKOFF, E.:  
Etudes sur la resorption des cellules. Ann. Inst. Pasteur 13 (1899) 737-765
8. DOAN, C.A.:  
The recognition of a biologic differentiation in the white blood cells. J. amer.med.Ass. 86 (1926) 1593-1597
9. ENGELFRIET, C.P., J.J. VAN LOGHEM:  
Studies on leucocyte iso- and auto-antibodies. Brit.J.Haematol. 7 (1961) 223-238
10. PAYNE, R.:  
Leucocyte agglutinins in human sera. Arch. intern. Med. 99 (1957) 587-606
11. PAYNE, R., M.R. ROLFS:  
Fetomaternal observations on leukoagglutinin transfusionsreactions. Amer. J. Med. 29 (1960) 449-458
12. MEDAWAR, P.B.:  
Immunity to homologous grafted skin. II. The relationship between the antigens of blood and skin. Brit.J.exp. Path. 27 (1946) 15

12. a)  
ROOD, VAN J.J., J.G. EERNISSE:  
The Detection of Transplantation Antigens in Leukocytes.  
Progr. Surg. 7 (1969) 217-252, Karger Basel/New York
13. FRIEDMAN, E.A., J.W. RETAN, D.C. MARSHALL, L. HENRY, J.P. MERRILL:  
Accelerated skin graft rejection in humans preimmunized with homologous peripheral leukocytes.  
J.clin.Invest 40 (1961) 2162
14. RAPAPORT, F.T., H.S. LAWRENCE, L. THOMAS, J.M. CONVERSE, W.S. TILLET, J.H. MULHOLLAND:  
Cross reactions to skin homograft in man.  
J.clin.Invest. 41 (1962) 2166
15. BRITTINGHAM, T.E., H. CHAPLIN JR.:  
Febrile transfusion reactions caused by sensitivity to donor leukocytes and platelets.  
J.A.M.A. 165 (1957) 819
16. DORF, M.E., S.Y. EGURO, G. CABRERA, E.J. YUNIS, J. SWANSON, D.B. AMOS:  
Detection of Cytotoxic Non-HL-A Antisera.  
Vox Sang. 22 (1972) 447-457
17. CEPPELLINI, R., E.S. CURTONI, P.L. MATTIUZ, V. MIGGIANO, G. SCUDELLER, A. SERRA:  
Genetics of leukocyte antigens. A family study of segregation and linkage.  
Histocompatibility testing (1967) 149, Munksgaard Copenhagen
18. KISSMEYER-NIELSEN, F., A. SVEJGAARD, S. AHRONS, L. STAUB-NIELSEN:  
Crossing over within the HL-A System.  
Nature 224 (1969) 75
19. MANN, D.L., C.N. ROGENTINE, J.L. FAHEY, S.G. NATHENSON:  
Molecular heterogeneity of human lymphoid (HL-A) alloantigens.  
Science 163 (1969) 1460-1462
20. KAHAN, B.D., R.A. REISFELD:  
Advances in the chemistry of transplantation antigens.  
Transplant.Proc. 1 (1969) 483-488
21. MANN, D.L., G.N. ROGENTINE, J.L. FAHEY, S. NATHENSON:  
Human lymphocytes membran (HL-A) alloantigens. Isolation, Purification and properties.  
J.Immunol. 103 (1969) 282-292

22. DAUSSET, J.:  
Presse med. 76, 28 (1968) 1397
23. LILLY, F., E.A. BOYSE, L.J. OLD:  
Lancet II (1964) 1207
24. TENNANT, J.R., G.D. SNELL:  
J.Nat. Cancer Inst. 41 (1968) 597
25. THORSBY, E., A. BRATLIE, S.O. LIE:  
Scand.J.Haemat. 6 (1970) 409
26. WALFORD, R.L., S. FINKELSTEIN, R.NEERHOUT,  
P.KONRAD, E.SHANBROM:  
Nature 225 (1970) 461
27. DAUSSET, J.:  
The Problem of Compatibility in Hematology with  
Partikular Reference to Bone Marrow Transplan-  
tation.  
Hämatologie (1970) 66-78
28. COLLEY, D.G., C.W. DE WITT:  
Mixed lymphocyte blastogenesis in response to  
multiple histocompatibility antigens.  
J.Immunol. 102 (1969) 107-116
29. DUPONT, B., L. STAUB-NIELSEN, A.SVEJGAARD:  
Relative importance of four LA loci in determining  
mixed lymphocyte reaction.  
Lancet (1971) 18
30. JERNE, N.K.:  
The generation of self-tolerance and of antibody  
diversity.  
Proc.nat.Acad.Sci. (1970), Washington
31. MC DEVITT, H.O., A. CHINITZ:  
Genetic control of the antibody response: Relation-  
ship between immune response and histocompatibility  
(H-2) type.  
Science 163 (1969) 1207-1208
32. HAUGHTON, G.:  
Isoantigenic complexity: a Speculative Essay.  
Folia biol. Praha 15 (1969)
33. ENGELFRIET, C.P.:  
Cytotoxic iso-antibodies against leukocytes.  
Thesis, Amsterdam (1966)
34. OH, J.H., M.H.GAULT, S.J.HELLE, J.B.DOSSETOR:  
Development of Lymphocytotoxic Antibodies in  
Hemodialysis Patients.  
Vox Sang. 22, 208-212

35. CEPPELLINI, R., F. CELADA, P.L.MATTIUZ,  
A. ZANALDA:  
Study of the possible correlation between blood  
antigens and histocompatibility in man. I. Produc-  
tion of leukoagglutinins by repeated transfusions  
from one donor.  
Ann. N.Y.Acad.Sci. 120 (1964) 335
36. BALNER, H., H. DERSJANT, J.J. VAN ROOD:  
A method to relate leukocyte antigens in monkeys.  
Transplantation 3 (1965) 320
37. OVERWEG, J., C.P. ENGELFRIET:  
Cytotoxic Leucocyte Iso-Antibodies Formed During  
the First Pregnancy.  
Vox Sang. 16 (1969) 97-104
38. JENSEN, K.G.:  
Leucocyte antibodies in serums of pregnant women.  
Vox Sang. 7 (1962) 454
39. JENSEN, K.G.:  
Complete and incomplete leucocyte-antibodies in  
serum of patients with transfusion reactions.  
Proc. 9th Congr.Europ.Soc.Hemat. Lisbon (1963)  
1096
40. JENSEN, K.G.:  
The significance of leuco-agglutinins for development  
of transfusion reactions.  
Dan.med.Bull. 9 (1962) 198
41. CURTONI, E.S., P.L. MATTIUZ:  
Gli iso-antigeni leucocitari nell'uomo. Immunologia  
e genetica.  
Transf. Sang. 12 (1967) 205
42. ENGELFRIET, C.P., A. BRITTEN:  
Cytotoxic antibodies against leucocytes.  
Vox Sang. 11 (1966) 334
43. BUCHANAN, D.I., K.P. DIERICH:  
Further studies on leukocyte isoantibodies in  
patients sera.  
Canad. med. Ass. J. 87 (1962) 620
44. BILLINGHAM, R.E., F.R.S.:  
Transplantation immunity and the maternal-fetal  
relation (concluded).  
The New England J. of Med. 2 (1964) 720
45. SCHRÖDER, J., A. DE LA CHAPELLE:  
Fetal Lymphocytes in the Maternal Blood.  
Blood 39 (1972) 2

46. PAYNE, R.:  
Further observations on leukoagglutinin transfusion reactions with special reference to leukoagglutinin transfusion reactions in women.  
Amer.J.Med. 29 (1960) 449
47. PAYNE, R., M.R. ROLFS:  
Further observations on leukoagglutinin transfusion reactions.  
Amer.J.Med. 29 (1960) 449-458
48. AHRONS, S., F. KISSMEYER-NIELSEN:  
Serological investigations of 1358 transfusion reactions in 74.000 transfusions.  
Dan.med.Bull. 15 (1968) 259
49. NYMAND, G., I. HERON, K.G. JENSEN, A. LUNDGAARD:  
Occurrence of Cytotoxic Antibodies During Pregnancy.  
Vox Sang. 21 (1971) 21-29
50. ROOD, VAN, J.J., A. VAN LEEUWEN, J.G. EERNISSE:  
Antibodies against leucocytes in sera of pregnant women.  
Proc. 7th Congr. Int.Soc. Blood Transfus. Roma, 872-876 (1958), Karger, Basel 1959
51. PAYNE, R., M.R. ROLFS:  
Fetomaternal leukocyte incompatibility.  
J.clin.Invest. 37 (1958) 1756-1763
52. HUMPHREY, J.H., WHITE, R.G.:  
Kurzes Lehrbuch der Immunologie.  
(1971)
53. TERASAKI, P.I., J.D. MC CLELLAND:  
Microdroplet assay of human serum cytotoxins.  
Nature 204 (1964) 998-1000 (London)
54. TERASAKI, P.I., M.R. MICKEY, J.N. YAMAZAKI, D. VREDEVOE:  
Maternalfetal incompatibility.  
Transplantation 9 (1970) 538-543
55. PARK, W.W.:  
Experimental trophoblastic embolism of lungs.  
J.Path. and Bact. 75 (1958) 257-265
56. JENSEN, K.G.:  
Leucocyte antibodies in serums of pregnant women.  
Vox Sang. 7 (1962) 454-469
57. DAUSSET, J., Y. TANGÜN:  
Leucocyte and platelet groups and their prestical significance.  
Vox Sang 10 (1965) 641-659, Basel

58. SHULMAN, N.R., V.J. MARDER, M.C.HILLER,  
E.COLLIER:  
Platelet and leukocyte isoantigens and their anti-  
bodies.  
Progress in Hematology (1964) 222-304
59. JENSEN, K.G.:  
Transplacental passage of leucocyte agglutinin  
occurring on account of pregnancy.  
Dan.Med.Bulletin (1960) 55-58
60. LALEZARI, P., M.NUSSBAUM, S.GELMAN, T.H.SPAET:  
Neonatal Neutropenia due to Maternal Isoimmuni-  
zation.  
Clin.Res. 7, 13
61. JENSEN, K.G.:  
Leukocyte antibodies in serums of pregnant women.  
Serology and Clinic II.  
Vox Sang. 9 (1964) 315-332
62. NAITO, S., M.R.MICKEY, A.J.EBBIN, J.STRAUSS,  
P.I.TERASAKI:  
Fetal Maternal Incompatibility. II. Direct cross-  
match Studies on 38 Children with Birth Defects.  
Histocompatibility Testing (1970) 489-494,  
Munksgaard, Kopenhagen
63. SALMON, Ch., D.SCHWARTZ:  
Analyse statistique d'une série de 630 malades  
polytransfusés: Essai d'interpretation des conditions  
de l'iso-immunisation.  
Rev.Hémat. 15 (1960) 162
64. STOLP, W.:  
39. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäko-  
logie (1972), Wiesbaden
65. LENGEROVA, A., M.VOJTISKOVA:  
Prolonged survival of syngeneic male skin grafts  
in parous C57BL mice.  
Folia biol. 9 (1963) 72-74
66. BREYERE, E.J., M.K. BARRETT:  
"Tolerance" in postpartum female mice induced by  
strain-specific matings.  
J.Nat.Cancer Inst. 24 (1960) 699-705
67. BREYERE, E.J., M.K.BARRETT:  
Prolonged survival of skin homografts in parous  
female mice.  
J.Nat.Cancer Inst. 25 (1960) 1405-1410

68. PEER, L.A., W.BERNHARD, C.G.WALKER, JR:  
Full-thickness skin exchanges between parents  
and their children.  
Am.J.Surg. 95 (1958) 239-245
69. PEER, L.A., I.S.WALIA, R.PULLEN:  
Observation on partial tolerance to skin homografts  
in man.  
Transpl. Bull. 26 (1960) 115-118
70. TERASAKI, P.I., R. PATEL, M.DIEPOW:  
Serotyping for homotransplantation. XXIV. Possible  
role in heart transplantation.  
Amer.J.Cardiol., in press (zit. nach 4)
71. PATEL, R., M.R.MICKEY, P.I.TERASAKI:  
Serotyping for homotransplantation. XVI. Analysis  
of kidney transplants from unrelated donors.  
New Engl.J.Med. 279 (1968) 501
72. LENGEROVA, A., V.VIKLICKY:  
Relative "Strength" of Histocompatibility Barriers  
as Compared on the Basis Different Criteria.  
Folia biol. 15 (1969) Praha
73. FELLOUS, M., J. DAUSSET:  
Probable haploid expression of HL-A-Antigens on  
human spermatozoon,  
Nature 225 (1970) 191-193
74. MICKEY, M.R., M. KREISLER, P.I.TERASAKI:  
Leukocyte Antigens and Disease. II. Alterations in  
Frequencies of Haplotypes associated with Chronic  
Glomerulonephritis.  
Histocompatibility Testing (1970) 237-242,  
Munksgaard, Kopenhagen
75. SVEJGAARD, A., F.KISSMEYER-NIELSEN:  
Complement-fixing Platelet Iso-Antibodies.  
I. Quantitative Technique for their Detection.  
Vox Sang. 14 (1968) 106-118
76. MUELLER-ECKHARDT, Ch., D.HEINRICH, J.ESCOLAR,  
U.GÖTZE:  
HL-A-spezifische, C'-fixierende antithrombozytäre  
Antikörper. I. Antikörper-Frequenz und Spezifität  
im Serum von 500 Schwangeren.  
Blut, Bd. XXIII (1971) 207-215
77. BERTRAMS, J., E.KUWERT, G.LINZENMEIER:  
Leukozyten-Isoantikörper. I. Vorkommen aggluti-  
nierender und zytotoxischer Antikörper gegen weiße  
Blutzellen im Serum erst- und mehrgebärender  
Frauen.  
Dtsch.med.Wschr. 95 (1970) 1145

78. BATCHELOR, J.R., SANDERSON, A.R.:  
Implications of cross-reactivity in the HL-A system.  
Transplant.Proc. (1970) 2, 133-143
79. CEPPELLINI, R.  
Discussion.  
Histocompatibility Testing (1965), 158  
Munksgaard Copenhagen
80. BERAH, M., J. HORS, J.DAUSSET:  
Concentration of transplantation antigens of human organs.  
Lancet II (1968) 106
81. HARRIS, R., J.D.Z.ZERVAS:  
Nature 221 (1969) 1062
82. SVEJGAARD, A.:  
Series Haematol. 2 (1969) 3
83. MÖLLER, E., A.E.EKLUND:  
Cytotoxic Effect of Iso-antibodies directed against ABO and Rh Antigens on Human Lymph Node Cells.  
Nature 206 (1965) 731-733
84. NYMAND, G., I.HERON, K.G.JENSEN:  
Micro Complement Fixation Test for Typing of Platelets. A New Method.  
Vox Sang. 20 (1971) 85-89
85. MOTTIRONI, V.D., P.I.TERASAKI:  
Lymphocytotoxins in Disease. I. Infectious Mononucleosis. Rubella, and Measles.  
Histocompatibility, Munksgaard, Kopenhagen 301-308
86. ROGENTINE, J R., G.N., B.A.PLOCINIK:  
Application of the Cr<sup>51</sup> cytotoxicity technique to the analysis to the analysis of human lymphocyte antigens.  
Transplantation 5 (1967) 1323
87. CELADA, F., B.ROTMAN:  
A fluorochrome test for immunocytotoxicity against tumour cells and leukocytes in agarose plates.  
Proc.nat.Acad.Sci. 57 (1967) 630
88. PATEL, R.,M.R.C.P., I.PAUL, Ph.D.TERASAKI:  
Significance of the positive crossmatch test in kidney transplantation .  
New Engl.J.of Med. 14 (1969) 735-738
89. KISSMEYER-NIELSEN, F., A.SVEJGAARD:  
Blocking effect of rheumatoid factor on complement fixation by thrombocyte iso-antibodies.  
Vox Sang. 12 (1967) 199-210

90. HARRINGTON, W.J., C.C.SPRAGUE, V.MINNICH,  
C.V.MOORE, R.C.AULVIN, R.DUBACH:  
Immunologic mechanisms in idiopathic and neonatal  
thrombocythopenic purpura.  
Ann.Int.Med. 38 (1953) 433
91. STEFANINI, M., G.I.PLITMAN, W.DAMASHEK,  
J.B.CHATTERJEA, I.B.MEDNIKOFF:  
Studies on platelets. XI. Antigenicity of platelets  
and evidence of platelet groups and types in man.  
J.Lab. and Clin.Med. 42 (1953) 723
92. PAYNE, R.:  
The association of febrile transfusion reactions  
with leuko-agglutinins.  
Vox Sang. 2 (1957) 233
93. LOGHEM, VAN J.J., JR., M. VAN DER HART,  
H.BORSTEL:  
The occurrence of complete and incomplete white  
cell antibodies.  
Vox Sang. 2 (1957) 257
94. DAUSSET, J.:  
Leuko-agglutinins. IV. Leuko-agglutinins and  
bloodtransfusion.  
Vox Sang. 4 (1954) 190
95. ENGELFRIET, C.P., J.J. VAN LOGHEM:  
Studies on leukocyte iso- and autoantibodies.  
Brit.J.Haemat. 7 (1961) 223-238
96. ROSSI, J.P., I.K.BRANDT:  
Transient granulocytopenia of the newborn associated  
with sepsis due to shigella alkalescens and maternal  
leukocyte agglutinins.  
J.Pediat. 56 (1960) 639-647
97. WALFORD, R.L., E.SHANBROM, G.M.TROUP,  
E.ZELLER, B.ACKERMAN:  
Lymphocyte grouping with defined antisera.  
Histocompatibility testing (1967) 221, Munksgaard  
Kopenhagen
98. DAUSSET, J., A.NENNA, H.BRECY:  
Leukoagglutinins V.  
Blood 9 (1954) 696-720
99. KILLMANN, S.A.:  
Leukocyte agglutinins in collagen disease.  
Acta rheumat. scand. 3 (1957) 209-227
100. WHYTE, H.M., I.L.YEE:  
Bloodgroups and agglutination of leukocytes.  
Austr. Ann.Med. 5 (1956) 214

101. HOWELL, E., B. TAYLOR:  
Leuko-agglutinin studies as a routine procedure  
in blood banking.  
Transfusion (USA) I (1961) 187
102. SEVER, TERASAKI:  
Maternal-Fetal Incompatibility. III. Central Nervous  
System and Cardiac Anomalies.  
Histocompatibility Testing (1970) 495-499  
Munksgaard, Copenhagen 1970
103. PAYNE, R.:  
The development and persistence of leucoagglutinins  
in parous women.  
Blood 19 (1962) 411-424
104. ROOD, VAN J.J., A. VAN LEEUWEN:  
Leukocyte grouping. A method and its application.  
J.clin.Invest. 42 (1963) 1382
105. ZMIJEWSKI, C.M., J.L.FLETCHER, W.G.CANNADY:  
The serologic relationship of 4a and 4b to the HL-A  
system.  
Histocompatibility Testing (1970), Munksgaard,  
Copenhagen
106. BODMER, W., J. BODMER, S.ADLER, R.PAYNE,  
J. BIALEK:  
Genetics of 4 and LA human leukocyte groups.  
Ann. N.Y.Acad.Sci. 129 (1966) 473
107. PAYNE, R., M.TRIPP, J.WEIGLE, W.BODMER,  
J.BODMER:  
A new leukocyte isoantigen system in man.  
Cold Spring Harbor Symp.Quant.Biol.Hum.gen.  
29 (1964) 285
108. AMOS, D.B., I.COHEN, J.P.NICKS, M.M.MACQUEEN,  
E.MEADICK:  
The inheritance of human leukocyte antigens. II. The  
recognition of individual specificities of the main  
system.  
Histocompatibility Testing (1967) 129, Munksgaard,  
Copenhagen
109. BATCHELOR, J.R., B.A.CHAPMAN:  
Genetic background and transplantation antigens.  
J.clin.Path. 20 (1967) 415
110. BATCHELOR, J.R., A.R.SANDERSON:  
Further studies with cytotoxic human isoantisera.  
Histocompatibility Testing (1967), 139, Munksgaard,  
Copenhagen

111. DAUSSET, J., P. IVANYI, J. COLOMBANI,  
N. FEINGOLD, L. LEGRAND:  
The Hu-1 system.  
Histocompatibility Testing (1967) 189  
Munksgaard, Copenhagen
112. ROOD, VAN J. J., A. VAN LEEUWEN, J. W. BRUNING,  
J. G. EERNISSE:  
Current status of human leukocyte groups.  
Ann. N. Y. Acad. Sci. (7th internat. transplant. conf.)  
129 (1966) 446
113. ROOD, VAN J. J., A. VAN LEEUWEN, A. SCHIPPERS,  
M. VAN BLANKENSTEIN, W. VOLKERS:  
Immunogenetics of the group Four, Five and Nine  
systems.  
Histocompatibility Testing 1967, 203,  
Munksgaard, Copenhagen (1967)
114. BATCHELOR, I. R., N. H. SELWOOD:  
HL-A Subloci: Are they valid?  
Histocompatibility Testing (1970) 243-250
115. SVEJGÅRD, A.:  
Complement Fixing Platelet Isoantibodies.  
III. Quantitation of the HL-A 2 Antigen on Platelets.  
Vox Sang. 17 (1969) 112-128
116. DAVIES, D. A. L., A. J. MANSTONE, D. C. VIZA,  
J. COLOMBANI, J. DAUSSET:  
Human transplantation antigens: the HL-A (Hu1)  
system and its homology with the mouse H-2 system.  
Transplantation 6 (1968) 571
117. MANN, D. L., G. N. ROGENTINE, J. L. FAHEY,  
S. NATHENSON:  
Human lymphocyte membran (HL-A) alloantigens:  
Isolation, purification and properties.  
J. Immunol. 103 (1969) 282-292
118. SUMMERELL, J. M., D. A. L. DAVIES:  
Further characterization of the soluble mouse and  
human transplantation antigens.  
Transplantation Proc. 1, 479-482
119. HEINRICH, D., Ch. MUELLER-ECKHARDT:  
HL-A-spezifische, C'fixierende antithrombozytäre  
Antikörper. II. Absorptions- und Elutionsunter-  
suchungen mit HL-A spezifischen Antikörpern.  
Blut 23 (1971) 267
120. COLOMBANI, J., M. COLOMBANI, H. DASTOT,  
E. TERRIER, M. BAILLET, B. JAULMES:  
Immunisation transfusionelle anti-HL-A après cir-  
culation extracorporelle.  
Nouv. Rév. franc. Hémat. 12 (1972) 201

121. DORF, M.E., EGURO, S.Y.:  
Cross-Reactions of HL-A Antibodies. III. Anamnestic Response.  
J. of Immunol. 4 (1973) Vol. 110
122. STAUB-NIELSEN, L., A.SVEJGAARD:  
HL-A Immunization and HL-A Types in Pregnancy,  
Tissue Antigens 2 (1972) 316-327
123. AMOS, B.:  
Human histocompatibility locus A.  
Science 195 (1968) 659-660
124. MAYR, W.R.:  
Das HL-A-System.  
Folia Haematol., Leipzig 97, 4 (1972) 245-258
125. ROOD, VAN J.J., A.LEEUWEN, A.M.J.SCHIPPERS,  
R.PEARCE, M. v. BLANKENSTEIN, W.VOLKERS:  
Immunogenetics of the group Four, Five and Nine  
systems.  
Histocompatibility Testing 203, (1967).
126. HOPPE, I.:  
Schwangerschaftsinduzierte Leukozyten- (HL-A-) Antikörper.  
Arch.Gynäk. 215 (1973) 199-214
127. BERTRAMS, J., KUWERT, E., W.M. GALLMEIER,  
H.E. REIS, C.G.SCHMIDT:  
Transient Lymphocyte HL-A Antigen "Loss" in a  
Case of Irradiated M. Hodgkin.  
Tissue Antigens 1 (1971) 105-108
128. GRUMET, F.C., A. COUKELL, J.G. BODMER,  
W.F. BODMER, H.O. MCDEVITT:  
Histocompatibility (HL-A) antigens associated with  
systemic lupus erythematosus: A possible genetic  
predisposition to the disease.  
New Engl. J. Med. 285 (1971) 193
129. IVÁNYI, P., S.GREGORAVÁ, M.MICKOVÁ, R.HAMPL,  
L.STÁRKA:  
Genetic association between a histocompatibility gene  
(H-2) and androgen metabolism in mice.  
Transplantation Proc. 1 (1973)
130. KISSMEYER-NIELSEN, F., F.JØRGENSEN, L.U.LAMM:  
The HL-A System in Clinical Medicine.  
Johns Hopkins med.J. 131 (1972) 385-400
131. MITTAL, K.K.:  
Current concepts of Histocompatibility.  
Can.J.Med.Technol. 34 (1972) 179-184

132. KISSMEYER-NIELSEN, F., H.ANDERSEN, M.HAUGE,  
K.E.KJERBYE, B.MOGENSEN, A.SVEJGAARD:  
HL-A-types in Danish Eskimos from Greenland.  
Tissue Antigens 1 (1971) 74-80
133. NAITO, S., M.R.MICKEY, A.HIRATA, P.I.TERASAKI:  
Autolymphocytotoxins Following Immunization by  
Pregnancy, Transplantation, and Disease.  
Tissue Antigens I (1971) 219-228
134. HAUGHTON, G.:  
Transplantation antigens of mice: cellular localization  
of antigen determined by the H-2 locus.  
Transplantation 4 (1966) 238
135. ROGENTINE, G.N. JR, P.GERBER:  
HL-A antigens of human lymphoid cells in long-term  
tissue cultures.  
Transplantation 8 (1969) 28
136. CHESSIN, L.N., S.BRAMSON, W.J.KUHNS,  
K. HIRSCHHORN:  
Studies on the A,B,O (H) blood groups on human  
cells in culture.  
Blood J. Hematol. 25 (1965) 944
137. AHRONS, S.:  
HL-A Antibodies: Influence on the Human Foetus.  
Tissue Antigens 1 (1971) 121-128
138. TERASAKI, P.I., M.R.MICKEY, J.N.YAMAZAKI,  
D.VREDEVOC:  
Maternal-fetal in compatibility. I. Incidence of HL-  
A antibodies and possible associations with congenital  
anomalities.  
Transplantation 9 (1970) 538-543
139. KESSLER, M., J.SCHNEIDER:  
Agglutinierende Leukozytenantikörper während  
der Schwangerschaft.  
Bibl. haemat. 37 (1971) 107-112, Basel
140. BERTRAMS, J., E. KUWERT, H.H. LOHMEYER:  
Die Spezifität von Leukozytenisoantikörpern zur  
Histocompatibilitätsbestimmung im Serum von  
Primi- und Multiparaen.  
Bibl. haematol. (Basel) 37 (1971) 98-106
141. CLARKE, C.A., J.BRADLEY, C.J.ELSON, W.T.A.  
DONOHUE, D.LEHANE, N.C.HUGHES-JONES:  
Intensive plasmaphoresis as a therapeutical measure  
in rhesus immunized women.  
Lancet 1 (1970) 793

142. MOULINIER, J.:  
Importance des antigenes HL-A dans la pathologie  
gravidigne et/on neonatale.  
Vortrag, gehalten auf dem 5. Internat. Symposium:  
Fötomaternale Inkompatibilität, Brüssel 1970
143. MOULINIER, J., M.C.MERLE, F.MESNIER,  
X.SERVANTIE, R.MAHON:  
Des anticorps antitissulaires sont-ils responsables  
des accidents foetaux les plus graves de l'immuni-  
zation maternelle anti-Rh?  
Minerva Ginecologica 22 (1970) 694-5
144. TOVEY, G.H., C.C.DARKE:  
Prevention of leukocyte antibody formation.  
Lancet 1 (1970) 1396
145. STOLP, W.:  
Leukozyten- und Thrombozytenantikörper bei weib-  
licher Sterilität.  
IV. Arbeitstagung über Probleme der Histokompati-  
bilitätstestung, München, 1972
146. PATEL, R., P.I.TERASAKI:  
Significance of the positive cross-match test in  
kidney-transplantation.  
New Engl. J. Med. 280 (1969) 735-739
147. TATRA, G.:  
Der Fötus als Allotransplantat.  
Fortschritt Med. 90/9 (1972 334-336, Wien
148. CEPPELLINI, R., G.D.BONNARD, COPPO, V.C.MIGGIANO  
M.POSPISH, E.S.CURTONI, M.PELLEGRINO:  
Transplantation Proc. 3 (1971) 58
149. FELBO, M., K.G.JENSEN:  
Death in childbirth following transfusion of leukocyte  
incompatible blood.  
Acta haemat. (Basel) 27 (1962) 113-119
150. JENSEN, G., KISSMEYER-NIELSEN, F.:  
Immunology of leukocytes.  
Progress in clinical pathology 3 (1969) 126-140  
New York, Grune & Stratton
151. TERASAKI, P.I., M.R.MICKEY:  
Histocompatibility-transplant correlation, reproduci-  
bility and new matching methods.  
Transplant. Proc. 3 (1971) 1057-1071
151. a)  
DAUSSET, J.:  
The Genetics of Transplantation Antigens.  
Transplant. Proc. III/1 (1971)

152. KISSMEYER-NIELSEN, F.:  
The HL-A system and Kidney transplantation.  
Humangenetik 14 (1972) 189 (Abstract)
153. OLIVER, R.T.D., J.A. SACHS, H. FESTENSTEIN:  
Influence of HL-A Matching, Antigenic Strength  
and Immune Responsiveness on Outcome of 349  
Cadaver Renal grafts.  
Lancet 30 (1972)
154. TERASAKI, P.I.:  
Vortrag auf dem internationalen Transplantations-  
kongreß 1971 in Den Haag
155. DAUSSET, J., F.T. RAPAPORT, L. LEGRAND,  
J. COLOMBANI, A. MARCELLI, BARGE:  
Skin Allograft Survival in 238 Human Subjects.  
Histocompatibility Testing, Munksgaard, Kopenhagen  
(1970)
156. PIETSCH, M.C., P.J. MORRIS:  
An association of HL-A 3 and HL-A 7 with Paralytic  
Poliomyelitis.  
Tissue Antigens 4 (1974) 50-55
157. BOYAM, A.:  
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 21 (1968) 97
158. COLOMBANI, J., D'AMARO, J., J. CABB, G. SMITH,  
A. SVEJGAARD:  
Transplantation Proc. 3 (1971) 121
159. ZERVAS, J.D., I.W. DELAMORE, M.C.G. ISRAELS:  
Leukocyte phenotypes in Hodgkin's disease.  
Lancet ii (1970) 634
160. WALFORD, R.L., E. ZELLER, S. FINKELSTEIN,  
G.S. SMITH, R. NEERHOUT, P. HASSAKIS,  
F. PEETOM:  
Segregant series (subloci) of the HL-A system,  
HL-A variants, the relation of HL-A Genotypes  
to disease states.  
Histocompatibility Testing (1970) 251
161. MOGENSEN, B., F. KISSMEYER-NIELSEN:  
Histocompatibility antigens on the HL-A locus in  
generalized choriocarcinoma.  
Lancet i (1968) 721
162. BEHAND, P.O., J.A. SIMPSON, H. DICK:  
Lancet 3 (1973) 1033
163. BREWERTON, D.A., M. CAFFREY, A. NICHOLLS,  
D. WALTERS, D.C.O. JAMES  
ibid. 994

164. BREWERTON, D.A., M.CAFFREY, A.NICHOLLS,  
D.WALTERS, J.K.OAFES, D.C.O. JAMES:  
ibid. 996
165. WHITE, A.G., R.S.BARNETSON, J.A.G.OH,  
C. and D.B.L. MCCLELLAND:  
The incidence of HL-A antigens in dermatitis  
herpetiformis.  
Brit.J.Derm. 89 (1973) 133
166. KUWERT, E., J. BERTRAMS:  
Die Bedeutung des HL-A-Antigensystems für die  
Tumorforschung.  
Zeitschr. f. Krebsforschung und Klin. Onkologie  
78 (1972) 204-218
167. NEMOZ, C., H.BETUEL, M.AMOROS, M.MOREL,  
J.CARRIE, C.CARBONNE, J.SITE:  
Ordinateure et spécificité des sérums antileukocy-  
taires.  
Simep Edition Lyon 1969
168. FEINGOLD, N.:  
Utilisation du coefficient de corrélation dans l'étude  
des groupes leucocytaires.  
Rev. franc. Etud. clin.biol. 11 (1966) 1036-1039
169. BERNOCO, D., S.CULLEN, G.SCUDELLER,  
G.TRINCHIERI, R.CEPPPELLINI:  
HL-A Molecules at the Cell Surface.  
Histocompatibility Testing (1972) 527
170. NEAUPOUR-SAUTES, C., D.SILVESTRE,  
F.M.KOURILSKY, J. DAUSSET:  
Independence of HL-A Antigens from the First and  
Second Locus at the Cell Surface.  
Histocompatibility Testing (1972) 540
171. NATHENSON, S.G.:  
Biochemical aspects of histocompatibility antigens.  
Transplant.Proc. 3 (1971) 1209-1211
172. REISFELD, R.A., B.D.KAHAN:  
Transplantation Antigens.  
Adv. Immunol. 12 (1970) 117
173. MIYAKAWA, Y., N.TANIGAKI, Y.YAGI, D.PRESSMAN:  
Common Antigen Structures of HL-A Antigens.  
I. Antigenic Determinants Recognized by Rabbits  
on Papain-Solubilized HL-A Molecular Fragments.  
Immunology 24 (1973) 67 •

174. ROOD, VAN J.J., A. VAN LEEUWEN, R.ZWEERNS:  
The 4a and 4b antigens: Do they or don't they.  
Histocompatibility testing (1970) 92-104  
Munksgaard, Kopenhagen
175. ROOD, VAN J.J.:  
Die Bedeutung der Leukozytengruppen für die  
Transplantationsserologie.  
Bibl. haemat. (Basel) 37 (1971) 53-69
176. BIAS, W.B., K.A.HOPKINS, J.R.HUTCHINSON,  
S.H. HSU:  
Evidence for an unlinked Gene which modifies  
HL-A Antigen Expression.  
Tissue Antigens 4 (1974) 36-41
177. YUNIS, E.J., F.E. WARD, D.B.AMOS:  
Observation of the CNAP phenomen.  
Histocompatibility Testing (1970) 351-356  
Munksgaard, Kopenhagen
178. BERAH, M., J.HORS, J.DAUSSET:  
Transplantation 9 (1970) 185
179. CIKES, M.:  
Expression of surface antigens on cultured tumor  
cells in relation to cell cycle.  
Transplant. Proc. 3 (1971) 1161
180. MAYR, W.R., D.MAYR:  
Schwache Ausprägung des Merkmals HL-A 2 in  
einer deutschen Familie.  
Z.Immun.Forsch. 144 (1972) 404-413
181. TONGIO, M.M., A.BERREBI, S.MAYER:  
A study of lymphocytotoxic antibodies in multiparous  
women havind had at least four pregnancies.  
Tissue Antigens 2 (1972) 378-388
182. DAVIES, D.A.L.:  
Transplantation antigens.  
in: Rapaport, F.T., J. Dausset (Eds.):  
Human Transplantation 618-634 (1968)  
New York: Grune and Stratton
183. DAVIES, D.A.L.; A.J. MANSTONE, D.C.VITA,  
J. COLOMBANI, J.DAUSSET:  
Human transplantation antigens: The HL-A (Hu-1)  
system and its homology with the mouse H 2 system.  
Transpl. 6 (1968) 571-586
184. KABAT, E.A.:  
Structural concepts in immunology and immun-  
chemistry.  
(Holt, Rinchart & Winston, New York, 1968)

185. CULLEN, P.R., M.M.PICKLES:  
HL-A 2 and 9 - A Possible Relationship.  
Tissue Antigens 2 (1972) 341
186. DAVIS, B.D., R. D.BECCO, H.N.EISEN, H.S.GINSBERG,  
W.B.WOOD, JR:  
Microbiology.  
Harper Internat. Edition, New York, Evanston u.  
London, 1970
187. FRANCIS, R.:  
Ann. Intern. Med. 39 (1953) 203
188. FAZEKAS DE ST.GROTH, S., R.G.WEBSTER:  
J.Exp.Med. 124 (1966) 331
189. TONGIO, M.M., A.BERREBI, B.PFEIFFER, S.MAYER:  
Serological studies on lymphocytotoxic antibodies  
in primiparous women.  
Tissue Antigens 1 (1971) 243-257
190. GROSS, W., D.HEINRICH, P.WALKER, Ch.MUELLER-  
ECKHARDT:  
Komplementfixierende und zytotoxische Antikörper  
des ABO-Blutgruppensystems als Störfaktor bei der  
Bestimmung von Thrombozyten- und Lymphozyten-  
antigenen.  
Vortrag auf der 5. Tagung der Deutschen Arbeits-  
gemeinschaft für Histokompatibilitätstestung in  
Gießen, am 5. und 6.10.1973
191. MITTAL, K.K., S.FERRONE, M.R.MICKEY, A.MICHELE  
PELLEGRINO, R.A.REISFELD, P.I.TERASAKI:  
Serological Characterization of Natural Antihuman  
Lymphocytotoxic Antibodies in Mammalian Sera.  
Transplant. 16/4 (1973)
192. JEANNET, M., J.G.BOOMER, W.F.BOOMER,  
M.SCHAPIRA:  
Lymphocytotoxic Sera Associated with the ABO and  
Lewis Red Cell Blood Groups.  
Histocompatibility Testing 1972, Munksgaard  
Kopenhagen
193. COLOMBANI, J., M.COLOMBANI, J.DAUSSET:  
Non-Complement-Fixing IgM Antibodies with  
Anti-HL-A 2 Specificity and blocking Activity.  
Transplantation 16/3 (1973)
194. SELWOOD, N.H.:  
Definition of Specificity and the Analysis of HL-A  
Reagents by a Computerised Numerical Method.  
HL-A Analysis.  
Tissue Antigens 2 (1972) 147-155

195. KISSMEYER-NIELSEN, F., K.E.KJERBYE:  
HL-A-Antisera and their Identification.  
Tissue Antigens 2 (1972) 182-188
196. PIAZZA, A.:  
Formal Genetics of the HL-A System and Computer Problems.  
Tissue Antigens 2 (1972) 163-172
197. IVAŠKOVÁ, E.:  
The Complex Nature of Antigen HL-A 2. Absorption Studies of Anti-HL-A 2 Sera on Cells from White and Black Individuals.  
Folia Biol. 18/6 (1972) 408-417
198. DEMANT, P., P.IVANYI, M.IVAŠA:  
The Values of the Correlation Coefficient of Antigens Controlled by Allelic Genes in the Population at Equilibrium.  
Folia biol., Tom. XII (1966) Acad. Praha
199. NIH (1969):  
Manual of Tissue Typing Techniques, compiled by Transplantation Immunology Branch, Collaborative Research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda Md.

## DANKSAGUNG

Herrn Prof. Dr. C. Mueller-Eckhardt möchte ich für die Überlassung des Themas und seine kritische Hilfestellung bei der Abfassung der Arbeit danken.

Besonderen Dank sage ich meiner Mutter, die durch ihre Mithilfe bei der mühseligen Kleinarbeit der letzten Arbeitstage wesentlich zur Fertigstellung der Arbeit beigetragen hat.



## LEBENS LAUF

- Geboren:** 25. Februar 1949 in Frankfurt /Main
- Eltern:** Eugen Rothenberg, kaufmännischer Angestellter  
Hedwig Rothenberg, geb. Becker
- Schulen:** 1955 - 1959: Volksschule Neu-Isenburg  
1959 - 1967: Neusprachliches Gymnasium  
Neu-Isenburg
- Hochschulen:** WS 1967/68 Romanistik in Frankfurt /M.  
SS 1968 - SS 1970 Medizin in Frankfurt /M.  
WS 1970/71 - SS 1973 Medizin in Gießen
- Staatsexamen:** 25. Februar 1974





